

# اثرات مکمل اسیدهای چرب $\omega_3$ بر روی کم خونی و فاکتورهای هماتولوژیک خون در بیماران همودیالیزی\*

دکتر اکرم کوشکی<sup>۱</sup>، دکتر فروغ اعظم طالبان<sup>۲</sup>، دکتر هادی طیبی<sup>۳</sup>

## چکیده

**زمینه و هدف:** یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ساز بیماری‌های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی، کم خونی می‌باشد. بنابراین، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اسیدهای چرب  $\omega_3$  بر روی کم‌خونی و شاخص‌های خونی بیماران همودیالیزی انجام شد.

**روش تحقیق:** این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که بر روی ۳۴ بیمار همودیالیزی بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. در این مطالعه بیماران گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  به مدت ۱۰ هفته، روزانه ۲۰۸۰ میلی‌گرم مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  و بیماران در گروه دارونما، روزانه دارونما دریافت کردند. در شروع مطالعه و پایان هفته دهم، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول‌های قرمز، MCV، MCH، MCHC خون و CRP سرم اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t-test، Chi-Square، Paired t-test و ANOVA صورت گرفت.

**یافته‌ها:** در این مطالعه میانگین سن بیماران و مدت زمان تحت درمان با همودیالیز در گروه اسیدهای چرب  $\omega_3$  به ترتیب  $50 \pm 18$  سال و  $23 \pm 25$  ماه و در گروه دارونما به ترتیب  $50 \pm 17$  سال و  $28 \pm 18$  ماه بود. در طول این مطالعه، تفاوت معنی‌داری از نظر میانگین تغییرات هموگلوبین، هماتوکریت، RBC، MCV، MCH، MCHC خون و CRP سرم بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگردید.

**نتیجه‌گیری:** یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  تأثیری بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و کم‌خونی در بیماران همودیالیزی ندارد.

**واژه‌های کلیدی:** اسیدهای چرب  $\omega_3$ ، همودیالیز، فاکتورهای هماتولوژیک، کم‌خونی.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. ۱۳۸۹؛ ۱۷(۳): ۱۴۹-۱۵۸

دریافت: ۱۳۸۸/۴/۸ اصلاح نهایی: ۱۳۸۹/۴/۲۲ پذیرش: ۱۳۸۹/۴/۲۹ درج در پایگاه وب: ۱۳۸۹/۷/۲۸

\* این پژوهش با کد IRCT138901263719N1 در مرکز بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی به ثبت رسیده است.

<sup>۱</sup> نویسنده مسؤول؛ استادیار، گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مشهد، ایران.

آدرس: سبزوار، جنب پلیس راه، دانشگاه علوم پزشکی، حوزه معاونت آموزشی، گروه علوم پایه.

پست الکترونیکی: akooski.nutr@yahoo.com

<sup>۲</sup> استاد، گروه تغذیه انسانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

<sup>۳</sup> استادیار، گروه تغذیه انسانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

## مقدمه

نارسایی مزمن کلیه بیماری است که در اثر تخریب پیش‌رونده و برگشت‌ناپذیر نفرون‌ها به وجود می‌آید و درمان آن در مراحل انتهایی از طریق دیالیز و یا پیوند کلیه صورت می‌گیرد (۱، ۲). مهم‌ترین علت مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه از جمله بیماران همودیالیزی، بیماری‌های قلبی و عروقی می‌باشد؛ به طوری که حدود ۵۰ درصد مرگ و میر بیماران همودیالیزی به دلیل این بیماری‌ها است و فراوانی بیماری‌های قلبی و عروقی در این بیماران ۳ تا ۴۵ برابر آن نسبت به کل جامعه می‌باشد (۳، ۴). در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، کم‌خونی شایع است و شدت آن با کاهش عملکرد کلیه افزایش می‌یابد (۵، ۶). کم‌خونی که با هموگلوبین کمتر از ۱۱ گرم در دسی‌لیتر در این بیماران مشخص می‌شود (۷)؛ با هیپرتروفی بطن چپ، نارسایی قلبی و مرگ و میر مرتبط می‌باشد (۸، ۶، ۵).

در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه از جمله همودیالیزی، وجود التهاب می‌تواند منجر به تشدید آنمی شود (۹). برخی مطالعات در بیماران همودیالیزی نشان داده‌اند که دریافت اسیدهای چرب  $\Omega_3$  می‌تواند سبب کاهش شاخص‌های التهابی شود (۱۱، ۱۰) از سوی دیگر برخی تحقیقات در بیماران مبتلا به هیپاتیت C و کم‌خونی داسی شکل نشان داده‌اند که دریافت اسیدهای چرب  $\Omega_3$  می‌تواند سبب افزایش غلظت هموگلوبین و بهبود کم‌خونی گردد (۱۲-۱۴). تاکنون پژوهش‌های بسیار اندکی در زمینه اثرات اسیدهای چرب  $\Omega_3$  روی شاخص‌های هماتولوژیک بیماران همودیالیزی صورت گرفته است. برخی از این تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف اسیدهای چرب  $\Omega_3$  می‌تواند سبب افزایش غلظت هموگلوبین (۱۵) و کاهش دوز اریتروپوئیتین مورد نیاز شود (۱۶)؛ در حالی که مطالعات دیگر نتوانسته‌اند این اثرات را نشان دهند (۱۷، ۱۸).

با توجه به شیوع گسترده کم‌خونی در بیماران همودیالیزی و مطالعات محدود صورت گرفته در زمینه اثرات اسیدهای چرب  $\Omega_3$  روی شاخص‌های هماتولوژیک این بیماران و نتایج متضاد به دست آمده، به نظر می‌رسد مطالعه حاضر بتواند در

مشخص نمودن اثرات اسیدهای چرب  $\Omega_3$  روی شاخص‌های هماتولوژیک بیماران همودیالیزی مؤثر باشد.

## روش تحقیق

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که بر روی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان واسعی شهر سبزوار انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت از تمایل بیمار به همکاری و گذشتن حداقل ۶ ماه از زمان شروع همودیالیز فرد بود. معیارهای خروج نیز شامل ابتلا به هیپاتیت و سایر بیماری‌های عفونی، تزریق خون به علت کم‌خونی شدید، نمایه توده بدنی (BMI یا Body Mass Index) کمتر از ۱۸/۵ یا بیشتر از ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع، مصرف داروهای ضدالتهابی استروئیدی و غیر استروئیدی، مصرف مکمل اسیدهای چرب  $\Omega_3$  و ویتامین‌های E و C در محدوده دو ماه قبل از شروع مطالعه بودند. برای بیماران همودیالیزی مورد مطالعه در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در صورتی که هماتوکریت آن‌ها زیر ۳۰ درصد بود؛ در هفته سه، دوز ۴۰۰۰ واحدی اریتروپوئیتین تجویز گردید. از بیماران همودیالیزی در صورت تمایل برای شرکت در این تحقیق، رضایت‌نامه کتبی اخذ گردید. از کلیه بیماران شرکت کننده در حالت ناشتا ۳ سی‌سی خون وریدی قبل از اتصال به دستگاه همودیالیز گرفته شد و به لوله‌های حاوی ماده ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استات ۳ درصد منتقل گردید. پس از اتمام عمل همودیالیز وزن هر بیمار با لباس سبک و با استفاده از ترازوی اهرمی با دقت ۱۰۰ گرم و قد بدون کفش هر بیمار توسط متر نصب شده بر روی دیوار با دقت ۰/۵ سانتیمتر اندازه‌گیری شد و مشخصات عمومی بیماران در برگه جمع‌آوری داده‌ها ثبت گردید.

در این مطالعه ۴۰ بیمار همودیالیزی واجد شرایط به طور تصادفی به گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب  $\Omega_3$  یا گروه دارونما اختصاص داده شدند. بیماران در گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب  $\Omega_3$  به مدت ۱۰ هفته، روزانه ۲۰۸۰ میلی‌گرم اسیدهای چرب  $\Omega_3$  به صورت ۴ کپسول

دریافت بیماران از نظر اجزای غذایی مؤثر در گلبول‌سازی یا پیشگیری از همولیز گلبول‌های قرمز (شامل آهن، اسید فولیک، ویتامین‌های  $B_{12}$ ،  $B_6$ ، C و E) توسط پرسش‌نامه یادآمد خوراک برای یک روز دیالیز و یک روز غیر دیالیز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌های یادآمد خوراک با استفاده از نرم‌افزار تغذیه‌ای Nutritionist IV و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون‌های  $t$ -test،  $\chi^2$ -Square، Paired  $t$ -test و آنالیز واریانس برای داده‌های تکراری صورت گرفت. در این مطالعه در صورتی که P معادل یا کمتر از ۰/۰۵ بود آن‌گاه آزمون‌های آماری معنی‌دار در نظر گرفته شدند.

### یافته‌ها

در این مطالعه از مجموع ۴۰ بیمار همودیالیزی شرکت کننده، ۳ بیمار از گروه اسیدهای چرب  $\omega_3$  و ۳ بیمار از گروه دارونما به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف یا عدم همکاری از مطالعه کنار گذاشته شدند. از مجموع ۳۴ بیمار باقیمانده در مطالعه، ۳۲ بیمار در هر هفته سه بار و ۲ بیمار در هر هفته دو بار تحت عمل همودیالیز به مدت چهار ساعت قرار گرفتند. صافی‌های مورد استفاده جهت همودیالیز کلیه بیماران از جنس Polysulfone بود. در این مطالعه میانگین سن بیماران و مدت زمان تحت درمان با همودیالیز در گروه اسیدهای چرب  $\omega_3$  به ترتیب  $18 \pm 50$  سال و  $25 \pm 23$  ماه و در گروه دارونما به ترتیب  $17 \pm 50$  سال و  $18 \pm 28$  ماه بود که تفاوت آماری معنی‌داری از این نظر بین دو گروه وجود نداشت. همچنین تفاوت آماری معنی‌داری از نظر میانگین وزن، BMI و کفایت همودیالیز بین دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت (جدول ۱).

در طول دوره مطالعه، دو گروه مورد بررسی از نظر میانگین دریافت اریتروپوئیتین تزریقی، مکمل آهن و اسید فولیک خوراکی که از عوامل مؤثر بر شاخص‌های هماتولوژیک هستند، تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (جدول ۲).

حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم Eicosapentaenoic Acid (EPA) و ۲۱۰ میلی‌گرم Docosahexaenoic Acid (DHA) دریافت کردند؛ در حالی که بیماران گروه دارونما روزانه ۴ کپسول دارونمای مشابه حاوی تری گلیسریدهای دارای اسیدهای چرب با طول زنجیر متوسط (Medium Chain Triglyceride) یا MCT) استفاده نمودند. جهت دو سوکور اجرای این تحقیق، در زمان شروع مطالعه مجموعه قوطی‌های حاوی مکمل یا دارونما توسط فردی غیر از پژوهشگران به صورت A و B کدگذاری شد تا عدم اطلاع محقق از نوع مکمل دریافتی توسط هر گروه رعایت شود. در پایان هفته دهم مطالعه دوباره از بیماران ۳ سی‌سی خون قبل از اتصال به دستگاه همودیالیز گرفته شد و در پایان جلسه همودیالیز بیماران وزن شدند.

در نمونه‌های خون گرفته شده از بیماران، غلظت هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC خون توسط دستگاه Cell counter اندازه‌گیری شد. غلظت (C-reactive protein یا CRP) سرم نیز به عنوان یک نشانگر التهاب با روش (ELISA یا Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) و با استفاده از کیت‌های شرکت Monobind آمریکا تعیین گردید.

در این مطالعه کفایت همودیالیز در مورد هر بیمار بر مبنای شاخص  $Kt/V$  تعیین شد. با استفاده از غلظت ازت اوره خون (Blood Urea Nitrogen یا BUN) در شروع و پایان همودیالیز، وزن خشک بعد از همودیالیز، مدت زمان تحت همودیالیز و همچنین میزان اولترا فیلتراسیون مایعات از بدن که از اطلاعات موجود در پرونده هر بیمار به دست می‌آید؛ با استفاده از فرمول زیر و با کمک نرم‌افزار محاسبه کننده شاخص  $Kt/V$  تعیین گردید (۱۹).

$$Kt/V = -\ln \left\{ \left[ \frac{\text{post-BUN}}{\text{pre-BUN}} - (0.08 \times t) \right] \times \left[ 4 - \left( \frac{3}{5} \times \frac{\text{post-BUN}}{\text{pre-BUN}} \right) \right] \times \frac{0.55}{UF/V_{ant}} \right\}$$

در شروع مطالعه و پایان هفته‌های پنجم و دهم، میزان

جدول ۱. مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان کفایت دیالیز، وزن و BMI در بیماران همودیالیزی دو گروه مورد مطالعه

| P value | زمان مطالعه   |               |               | تعداد | گروه                   | شاخص‌ها                     |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------------|
|         | هفته دهم      | هفته پنجم     | شروع مطالعه   |       |                        |                             |
| ۰/۸۳    | $1/8 \pm 0/6$ | -----         | $1/7 \pm 1$   | ۱۷    | اسیدهای چرب $\omega_3$ | کفایت دیالیز<br>(Kt/V)      |
| ۰/۴۰    | $1/5 \pm 0/5$ | -----         | $1/7 \pm 0/9$ | ۱۷    | دارونما                |                             |
|         | ۰/۱۴          |               | ۰/۸۱          |       | P Value                |                             |
| ۰/۱۰    | $52 \pm 10$   | $52 \pm 10$   | $52 \pm 11$   | ۱۷    | اسیدهای چرب $\omega_3$ | وزن<br>(kg)                 |
| ۰/۱۹    | $57 \pm 11$   | $57 \pm 11/5$ | $56 \pm 12$   | ۱۷    | دارونما                |                             |
|         | ۰/۲۵          | ۰/۲۱          | ۰/۲۳          |       | P Value                |                             |
| ۰/۰۹    | $20 \pm 3$    | $19/5 \pm 3$  | $19/5 \pm 3$  | ۱۷    | اسیدهای چرب $\omega_3$ | BMI<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |
| ۰/۲۱    | $20/5 \pm 4$  | $20/5 \pm 4$  | $20 \pm 4$    | ۱۷    | دارونما                |                             |
|         | ۰/۵۵          | ۰/۴۶          | ۰/۴۸          |       | P Value                |                             |

جدول ۲. مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان دریافت داروهای اریتروپویتین، آهن و اسید فولیک در بیماران همودیالیزی دو گروه مورد مطالعه

| P value | میزان دریافت    | تعداد | گروه‌ها                | داروی مصرفی                       |
|---------|-----------------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| ۰/۹۶    | $4106 \pm 1229$ | ۱۷    | اسیدهای چرب $\omega_3$ | اریتروپویتین تزریقی<br>(u/wk)     |
|         | $4082 \pm 1867$ | ۱۷    | دارونما                |                                   |
| ۰/۴۸    | $47 \pm 37$     | ۱۷    | اسیدهای چرب $\omega_3$ | آهن (سولفات فرو) خوراکی<br>(mg/d) |
|         | $56 \pm 35$     | ۱۷    | دارونما                |                                   |
| ۰/۳۰    | $1 \pm 0/24$    | ۱۷    | اسیدهای چرب $\omega_3$ | اسید فولیک خوراکی<br>(mg/d)       |
|         | $1/1 \pm 0/39$  | ۱۷    | دارونما                |                                   |

معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. در پایان مطالعه در گروه دریافت کننده اسیدهای چرب  $\omega_3$  آنمی در ۷۱ درصد بیماران و در گروه دارونما آنمی در ۵۹ درصد بیماران وجود داشت اما این تفاوت باز هم از نظر آماری معنی‌دار نبود.

در شروع مطالعه دو گروه مورد بررسی از نظر میانگین فاکتورهای هماتولوژیک مختلف شامل تعداد گویچه‌های سرخ، غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (جدول ۴).

در این مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری بین میزان دریافت اجزای غذایی مؤثر در گلبول‌سازی یا پیشگیری از همولیز گلبول‌های قرمز (شامل آهن، اسید فولیک، ویتامین‌های B<sub>۱۲</sub>، B<sub>۶</sub>، C و E) بین دو گروه در شروع مطالعه و پایان هفته‌های پنجم و دهم مشاهده نگردید (جدول ۳).

در شروع مطالعه در گروه دریافت کننده اسیدهای چرب  $\omega_3$  حدود ۷۶/۵ درصد بیماران آنمی داشتند؛ در حالی که در ۵۳ درصد گروه دارونما آنمی دیده شد، که تفاوت آماری

جدول ۳. مقایسه میانگین و انحراف معیار اجزای غذایی مؤثر در گلبول‌سازی یا پیشگیری از همولیز گلبول‌های قرمز در بیماران همودیالیزی دو گروه مورد مطالعه

| P value | زمان مطالعه |           |             | تعداد | گروه                   | اجزای رژیم غذایی        |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------|------------------------|-------------------------|
|         | هفته دهم    | هفته پنجم | شروع مطالعه |       |                        |                         |
| ۰/۶۹    | ۲۳/۵ ± ۶    | ۲۲ ± ۸    | ۲۲ ± ۸      | ۱۷    | $\Omega_3$ اسیدهای چرب | آهن                     |
| ۰/۶۷    | ۲۳ ± ۵/۵    | ۲۲ ± ۷/۵  | ۲۴ ± ۹      | ۱۷    | دارونما                | (mg/d)                  |
|         | ۰/۸۵        | ۰/۹۷      | ۰/۵۲        |       | <b>P</b>               |                         |
| ۰/۸۲    | ۱۰۳ ± ۳۸    | ۱۱۰ ± ۶۶  | ۱۱۱ ± ۴۴    | ۱۷    | $\Omega_3$ اسیدهای چرب | اسید فولیک              |
| ۰/۹۳    | ۱۰۵ ± ۴۷    | ۱۰۸ ± ۵۸  | ۱۰۳ ± ۳۳    | ۱۷    | دارونما                | ( $\mu$ g/d)            |
|         | ۰/۹۰        | ۰/۹۴      | ۰/۵۹        |       | <b>P</b>               |                         |
| ۰/۳۹    | ۱/۱ ± ۰/۵   | ۱/۵ ± ۱/۴ | ۱/۱ ± ۰/۷   | ۱۷    | $\Omega_3$ اسیدهای چرب | ویتامین B <sub>۱۲</sub> |
| ۰/۴۴    | ۱/۲ ± ۰/۵   | ۱/۳ ± ۱   | ۱/۵ ± ۰/۶   | ۱۷    | دارونما                | ( $\mu$ g/d)            |
|         | ۰/۶۸        | ۰/۶۲      | ۰/۱۱        |       | <b>P</b>               |                         |
| ۰/۷۲    | ۱ ± ۰/۹     | ۱ ± ۰/۷   | ۰/۹ ± ۰/۵   | ۱۷    | $\Omega_3$ اسیدهای چرب | ویتامین B6              |
| ۰/۰۱    | ۰/۸ ± ۰/۶   | ۱/۱ ± ۰/۵ | ۰/۸ ± ۰/۵   | ۱۷    | دارونما                | (mg/d)                  |
|         | ۰/۵۳        | ۰/۶۳      | ۰/۸۴        |       | <b>P</b>               |                         |
| ۰/۶۲    | ۵۱ ± ۳۳     | ۵۷ ± ۵۳   | ۶۳ ± ۵۰     | ۱۷    | $\Omega_3$ اسیدهای چرب | ویتامین C               |
| ۰/۷۱    | ۳۸ ± ۳۶     | ۴۰ ± ۳۳   | ۴۷ ± ۳۸     | ۱۷    | دارونما                | (mg/d)                  |
|         | ۰/۲۹        | ۰/۲۷      | ۰/۲۸        |       | <b>P</b>               |                         |
| ۰/۰۸    | ۱ ± ۰/۵     | ۰/۷ ± ۰/۵ | ۰/۹ ± ۰/۴   | ۱۷    | $\Omega_3$ اسیدهای چرب | ویتامین E               |
| ۰/۸۹    | ۱/۲ ± ۰/۷   | ۱/۱ ± ۰/۸ | ۱/۲ ± ۰/۵   | ۱۷    | دارونما                | (mg/d)                  |
|         | ۰/۳۷        | ۰/۰۷      | ۰/۱۲        |       | <b>P</b>               |                         |

در طول مطالعه میانگین MCV و MCH در هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش یافت ( $P < ۰/۰۱$ )؛ اما دو گروه از نظر میزان کاهش MCV و MCH تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (جدول ۴). همچنین در طول مطالعه میانگین MCHC در هر دو گروه به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد ( $P < ۰/۰۱$ ) اما دو گروه از نظر میزان افزایش میانگین MCHC تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (جدول ۴).

در شروع مطالعه دو گروه مورد بررسی از نظر میانگین غلظت CRP سرم تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. در طول مطالعه نیز تغییر معنی‌داری در غلظت CRP سرم دو گروه ایجاد نشد (جدول ۴).

در طول دوره مطالعه تعداد گویچه‌های سرخ در هر دو گروه به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد ( $P < ۰/۰۱$ ) اما از نظر میزان افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری دیده نشد (جدول ۴). همچنین در طول مطالعه تغییر آماری معنی‌داری در غلظت هموگلوبین دو گروه مشاهده نگردید (جدول ۴).

در این مطالعه میانگین هماتوکریت در گروه دریافت‌کننده اسیدهای چرب  $\Omega_3$  به طور معنی‌داری کاهش یافت ( $P < ۰/۰۵$ ). در گروه دارونما نیز میانگین هماتوکریت در طول دوره مطالعه کاهش یافت اما این کاهش به حد معنی‌دار نرسید ( $P = ۰/۰۶$ ، جدول ۴). میزان کاهش هماتوکریت بین دو گروه مورد بررسی تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد (جدول ۴).

جدول ۴. مقایسه میانگین و انحراف معیار فاکتورهای هماتولوژیک خون و CRP سرم در بیماران همودیالیزی دو گروه مورد مطالعه

| P value    | زمان مطالعه         |                     | تعداد | گروه‌ها                | شاخص‌ها                                 |
|------------|---------------------|---------------------|-------|------------------------|---|
|            | پایان مطالعه        | شروع مطالعه         |       |                        |   |
| $P < .001$ | $3.7 \pm 0.7^{*12}$ | $3.2 \pm 0.6^{*12}$ | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | تعداد گویچه‌های سرخ<br>(در هر لیتر خون) |
| $P < .001$ | $4 \pm 1^{*12}$     | $3.5 \pm 0.8^{*12}$ | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |
| ۰/۲۹       | $9.8 \pm 1.7$       | $10.1 \pm 1.8$      | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | هموگلوبین<br>(g/dl)                     |
| ۰/۲۸       | $9.99 \pm 2.1$      | $10.4 \pm 1.8$      | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |
| ۰/۰۳       | $29.5 \pm 5.4$      | $31.1 \pm 5.6$      | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | هماتوکریت<br>(%)                        |
| ۰/۰۶       | $30.4 \pm 6.5$      | $32.5 \pm 6.2$      | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |
| $P < .001$ | $80.3 \pm 3.4$      | $96.8 \pm 4.5$      | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | MCV<br>(fl)                             |
| $P < .001$ | $77.5 \pm 7.4$      | $94.4 \pm 8.2$      | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |
| $P < .001$ | $26.8 \pm 1.4$      | $31.2 \pm 1.5$      | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | MCH<br>(pg/cell)                        |
| $P < .001$ | $25.5 \pm 2.7$      | $30.2 \pm 3$        | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |
| $P < .001$ | $33.3 \pm 0.66$     | $32.2 \pm 0.93$     | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | MCHC<br>(g/dl)                          |
| $P < .001$ | $32.9 \pm 0.66$     | $32 \pm 1.1$        | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |
| ۰/۱۸       | $4.1 \pm 4.1$       | $3.01 \pm 3.8$      | ۱۷    | اسیدهای چرب $\Omega_3$ | CRP<br>(mg/l)                           |
| ۰/۰۶       | $4.3 \pm 5.3$       | $3.1 \pm 5$         | ۱۷    | دارونما<br>P           |   |

## بحث

در هر دو گروه مورد بررسی به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد و این مسأله ناشی از دریافت داروی اریتروپوئیتین توسط هر دو گروه بود؛ چرا که داروی اریتروپوئیتین سبب تحریک تولید گویچه‌های سرخ توسط مغز استخوان می‌گردد. در این پژوهش دو گروه مورد بررسی از نظر افزایش تعداد گویچه‌های سرخ خون تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند و این امر نشان می‌دهد که مصرف مکمل اسیدهای چرب  $\Omega_3$  سبب تشدید اثرات داروی اریتروپوئیتین بر تولید گویچه‌های سرخ نمی‌شود. تاکنون در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است و در موافقت با مطالعه حاضر،

در مطالعه حاضر دو گروه مورد بررسی از نظر میانگین دریافت روزانه مکمل اسید فولیک و آهن و میانگین دریافت هفتگی داروی اریتروپوئیتین که سه عامل مؤثر بر غلظت شاخص‌های هماتولوژیک خون هستند، تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. همچنین دو گروه مورد بررسی تفاوت آماری معنی‌داری از نظر میزان دریافت اجزای غذایی مؤثر در گلبول‌سازی یا پیشگیری از همولیز گلبول‌های قرمز (شامل آهن، اسید فولیک، ویتامین‌های  $B_{12}$ ،  $B_6$ ، C و E) با یکدیگر نداشتند. در این تحقیق تعداد گویچه‌های سرخ خون

حد طبیعی کمتر از ۹۲ فمتولیترا برسد (۲۰). در تنها مطالعه انجام شده در این زمینه، Donnelly و همکاران نشان داده‌اند که مصرف اسیدهای چرب  $\omega_3$  سبب تغییری در هماتوکریت خون بیماران همودیالیزی نمی‌شود (۱۸). تاکنون در زمینه اثرات مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  بر روی شاخص MCV مطالعه‌ای صورت نگرفته است تا بتوانیم یافته‌های آن را با مطالعه حاضر مقایسه نماییم.

در طول مطالعه حاضر میانگین شاخص MCH که نشان دهنده متوسط هموگلوبین موجود در هر گویچه سرخ است، در دو گروه مورد بررسی به طور معنی‌داری کاهش یافت. این مطلب نشانگر آنست که مصرف اسیدهای چرب  $\omega_3$  تأثیری بر روی شاخص MCH نداشته است. تاکنون در زمینه اثرات مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  بر شاخص MCH مطالعه‌ای صورت نگرفته است تا بتوانیم یافته‌های آن را با مطالعه حاضر مقایسه نماییم. کاهش شاخص MCH در دو گروه مورد بررسی به دلیل آن است که این شاخص از تقسیم هموگلوبین خون به تعداد گویچه‌های سرخ به دست می‌آید (۲۱). در طول این مطالعه، غلظت هموگلوبین خون در هر دو گروه بدون تغییر بود اما تعداد گویچه‌های سرخ در هر دو گروه افزایش یافت، در نتیجه از شاخص MCH در هر دو گروه کاسته شد. در شروع مطالعه حاضر، میانگین شاخص MCHC که نشان دهنده متوسط غلظت هموگلوبین موجود در هر گلبول قرمز بود، در دو گروه در محدوده طبیعی (۳۶-۳۲ گرم در دسی‌لیتر) قرار داشت (۲۱). در طول مطالعه حاضر، میانگین شاخص MCHC که نشان دهنده متوسط غلظت هموگلوبین موجود در هر گویچه سرخ است، در دو گروه به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد، اما دو گروه از نظر میزان افزایش MCHC تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. این مطلب نشان داد که مصرف مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  تأثیری بر روی شاخص MCHC ندارد. تاکنون در زمینه اثرات مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  بر روی شاخص MCHC مطالعه‌ای صورت نگرفته است تا بتوانیم یافته‌های آن را با مطالعه حاضر مقایسه نماییم. افزایش شاخص MCHC در دو

Vernaglione و همکاران نشان دادند که مصرف روزانه ۲ گرم اسیدهای چرب  $\omega_3$  به مدت ۴ ماه سبب تغییر معنی‌داری در تعداد گلبول‌های قرمز نمی‌شود (۱۷).

در طول مطالعه حاضر، تغییر معنی‌داری در میانگین غلظت هموگلوبین در گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  مشاهده نگردید. این یافته در موافقت با یافته‌های Vernaglione و همکاران است (۱۷). همچنین Donnelly و همکاران نشان دادند که مصرف ۳/۶ گرم اسیدهای چرب  $\omega_3$  به مدت ۴ هفته سبب تغییری در غلظت هموگلوبین خون بیماران همودیالیزی نمی‌شود (۱۸). بر خلاف مطالعات ذکر شده، Perunicic- Pekovic و همکاران در یک مطالعه نیمه تجربی نشان دادند که مصرف روزانه ۲/۴ گرم اسیدهای چرب  $\omega_3$  به مدت ۲ ماه سبب افزایش معنی دار غلظت هموگلوبین خون می‌شود (۱۵).

در طول این مطالعه، میانگین هماتوکریت در گروه دریافت کننده اسیدهای چرب  $\omega_3$  به طور معنی‌داری کاهش یافت. در گروه دارونما نیز میانگین هماتوکریت در طول دوره مطالعه کاهش یافت اما این کاهش به حد معنی‌دار نرسید ( $P = ۰/۰۶$ ). این مطلب نشانگر آنست که مصرف اسیدهای چرب  $\omega_3$  تأثیری بر هماتوکریت خون ندارد. هماتوکریت در واقع نشانگر حجمی از خون است که توسط گلبول‌های قرمز اشغال می‌شود. بنابراین کاهش هماتوکریت در دو گروه مورد بررسی، به دلیل کاهش حجم متوسط گلبول‌های قرمز یا به عبارت دیگر کاهش شاخص MCV است. با توجه به این که در طول این مطالعه میانگین دریافت روزانه مکمل اسید فولیک بین دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری نداشت؛ از این رو کاهش معنی‌دار MCV در دو گروه مورد بررسی می‌تواند به دلیل مصرف منظم قرص‌های اسید فولیک توسط بیماران در طول مطالعه باشد. این امر در اثر تأکید محققین به مصرف منظم قرص‌های اسید فولیک ناشی می‌شود. مصرف منظم مکمل اسید فولیک سبب شد گویچه‌های سرخ که در ابتدای مطالعه به صورت ماکروسیت بودند و میانگین MCV در هر دو گروه بالاتر از ۹۲ فمتولیترا بود، در پایان مطالعه به

تعداد بیماران همودیالیزی مبتلا به آنمی و بهبودی در فاکتورهای هماتولوژیک این بیماران مشاهده نشد. با توجه به این که در این مطالعه تجویز مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  در میزان ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز تأثیری بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و آنمی نداشت؛ پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده اثرات مقادیر بالاتر اسیدهای چرب  $\omega_3$  مورد بررسی قرار گیرد.

### نتیجه‌گیری

یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  در مقادیر حدود ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز تأثیری بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و کم‌خونی در بیماران همودیالیزی ندارد.

### تقدیر و تشکر

بدین‌وسیله از معاونت محترم پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، پرسنل محترم بخش همودیالیز بیمارستان واسعی سبزوار، سرکار خانم دکتر نورافشار، جناب آقای دکتر هدایتی و بیماران شرکت کننده در این تحقیق که همکاری صمیمانه‌ای داشتند، تقدیر و تشکر می‌نماییم.

گروه مورد بررسی به این دلیل است که شاخص MCHC از تقسیم هموگلوبین خون بر هماتوکریت به دست می‌آید و چون در طول این مطالعه غلظت هموگلوبین خون در هر دو گروه مورد بررسی تغییری پیدا نکرد اما هماتوکریت در هر دو گروه کاهش یافت؛ در نتیجه شاخص MCHC در هر دو گروه افزایش نشان می‌دهد.

در این مطالعه مصرف مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  نتوانست سبب کاهش معنی‌دار درصد بیماران همودیالیزی مبتلا به آنمی در گروه دریافت کننده اسیدهای چرب  $\omega_3$  در مقایسه با گروه دارونما شود. به طور کلی تصور این مطلب که اسیدهای چرب  $\omega_3$  می‌توانند به بهبود آنمی در بیماران همودیالیزی کمک نمایند، ناشی از آن است که سیتوکین‌های التهابی سبب اختلال در گلبول‌سازی می‌شوند (۹) و چون برخی از مطالعات نشان داده‌اند که اسیدهای چرب  $\omega_3$  قادر به کاهش التهاب می‌شوند (۱۱، ۱۰)؛ تصور می‌شود که این اسیدهای چرب ممکن است از طریق کاهش التهاب به بهبود آنمی در بیماران همودیالیزی کمک نماید. در این مطالعه تجویز مکمل اسیدهای چرب  $\omega_3$  نتوانست سبب کاهش شاخص التهابی CRP سرم گردد و بنابراین چون تجویز اسیدهای چرب  $\omega_3$  در دوز حدود ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز نتوانست سبب کاهش التهاب شود؛ به همین دلیل کاهش در

## References

1. Shorecki K, Green J, Brenner BM. Chronic renal failure. In: Kasper DL, Harrison TR, Editors. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Division; 2005. p. 1653-63.
2. Ziyadeh FN. Approach to the patient with chronic renal failure. In: Humes HD, Editor. Kelley's Textbook of Internal Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 1133-4.
3. Singh AK, Brenner BM. Dialysis in the treatment of renal failure. In: Kasper DL, Harrison TR, Editors. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Division; 2005. p. 1663-7.
4. Jungers P, Nguyen KT, Massy ZA, Zingraff J, Labrunie M, Descamps-Latscha B, et al. Incidence of atherosclerotic arterial occlusive accidents in predialysis and dialysis patients: a multicentric study in the Ile de France district. Nephrol Dial Transplant 1999; 14(4): 898-902.
5. Astor BC, Coresh J, Heiss G, Pettitt D, Sarnak MJ. Kidney function and anemia as risk factors for coronary heart disease and mortality: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am Heart J 2006; 151(2): 492-500.

6. Virani SA, Khosla A, Levin A. Chronic kidney disease, heart failure and anemia. *Can J Cardiol* 2008; 24 Suppl B: 22B-24B.
7. NKF KDOQI Guidelines. KDOQI clinical practice guideline and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease: 2007 update of hemoglobin target. *Am J Kidney Dis* 2007; 50(3): 479.
8. Locatelli F, Pozzoni P, Del Vecchio L. Anemia and heart failure in chronic kidney disease. *Semin Nephrol* 2005; 25(6): 392-6.
9. Stenvinkel P. Anaemia and inflammation: what are the implications for the nephrologist? *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18 Suppl 8: viii17-viii22.
10. Saifullah A, Watkins BA, Saha C, Li Y, Moe SM, Friedman AN. Oral fish oil supplementation raises blood omega-3 levels and lowers C-reactive protein in haemodialysis patients--a pilot study. *Nephrol Dial Transplant* 2007; 22(12): 3561-7.
11. Rasic-Milutinovic Z, Perunicic G, Pljesa S, Gluvic Z, Sobajic S, Djuric I, et al. Effects of N-3 PUFAs supplementation on insulin resistance and inflammatory biomarkers in hemodialysis patients. *Ren Fail* 2007; 29(3): 321-9.
12. Ide T, Okamura T, Kumashiro R, Koga Y, Hino T, Hisamochi A, et al. A pilot study of eicosapentaenoic acid therapy for ribavirin-related anemia in patients with chronic hepatitis C. *Int J Mol Med* 2003; 11(6): 729-32.
13. Seki R, Okamura T, Ide T, Kage M, Sata M, Uyesaka N, et al. Impaired filterability of erythrocytes from patients with chronic hepatitis C and effects of eicosapentaenoic acid on the filterability. *J Physiol Sci* 2007; 57(1): 43-49.
14. Ren H, Obike I, Okpala I, Ghebremeskel K, Ugochukwu C, Crawford M. Steady-state haemoglobin level in sickle cell anaemia increases with an increase in erythrocyte membrane n-3 fatty acids. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 2005; 72(6): 415-1.
15. Perunicic-Pekovic GB, Rasic ZR, Pljesa SI, Sobajic SS, Djuricic I, Maletic R, et al. Effect of n-3 fatty acids on nutritional status and inflammatory markers in haemodialysis patients. *Nephrology (Carlton)* 2007; 12(4): 331-6.
16. Vergili-Nelsen JM. Benefits of fish oil supplementation for hemodialysis patients. *J Am Diet Assoc* 2003; 103(9): 1174-7.
17. Vernaglione L, Cristofano C, Chimienti S. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and proxies of cardiovascular disease in hemodialysis: a prospective cohort study. *J Nephrol* 2008; 21(1): 99-105.
18. Donnelly SM, Ali MA, Churchill DN. Effect of n-3 fatty acids from fish oil on hemostasis, blood pressure, and lipid profile of dialysis patients. *J Am Soc Nephrol* 1992; 2(11): 1634-9.
19. Daugirdas JT, Stone JC. Physiologic principles and urea kinetic modeling. In: Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS, Editors. *Handbook of Dialysis*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 15-45.
20. Wallach JB. *Interpretation of Diagnostic Tests: A Synopsis of Laboratory Medicine*. 4<sup>th</sup> ed. Boston: Little, Brown; 1986. p.247.
21. Lee RD, Nieman DC. *Nutritional Assessment*. 3<sup>rd</sup> ed. New York: McGraw Hill; 2003.

Abstract

Original Article

Effects of  $\omega_3$  fatty acid supplement on anemia and hematologic factors in hemodialysis patients\*A. Kooshki<sup>1</sup>, FA. Taleban<sup>2</sup>, H. Tabibi<sup>3</sup>

**Background and Aim:** Anemia is one of the major risk factors for cardiovascular disease (CVD) in hemodialyzed patients. Therefore, the present study was designed to investigate the effects of  $\omega_3$  fatty acid supplement on anemia and hematologic factors in hemodialysis patients.

**Materials and Methods:** The study was a double-blind randomized clinical trial on 34 hemodialysis patients. The patients in the  $\omega_3$  fatty acid supplement group received 2080 mg  $\omega_3$  fatty acid daily for 10 weeks, while the placebo group received placebo for the same period. At baseline and the end of 10<sup>th</sup> week of the study, blood hemoglobin, hematocrit, red blood cells, MCV, MCH, MCHC and serum CRP were measured. Statistical analysis of the data was performed using chi-square, t-test, paired t-test and ANOVA.

**Results:** The mean age and duration of dialysis were  $50 \pm 18$  years and  $23 \pm 25$  months in the  $\omega_3$  fatty acid group and  $50 \pm 17$  years and  $28 \pm 18$  months in the placebo group, respectively. During this study, no significant difference was observed between the two groups in mean changes of blood hemoglobin, hematocrit, red blood cells, MCV, MCH, MCHC and serum CRP.

**Conclusion:** The results of the present study indicate that  $\omega_3$  fatty acid supplement has no effect on hematologic factors and anemia in hemodialysis patient.

**Keywords:**  $\omega_3$  fatty acid, Hemodialysis, Hematologic factors, Anemia.

*Journal of Birjand University of Medical Sciences 2010; 17(3): 158.*

*Received: 29.06.2009*

*Last Received: 13.07.2010*

*Accepted: 20.07.2010*

*Online Version: 20.10.2010*

\* This research is registered in Iranian Registry of Clinical Trials by IRCT138901263719N1 code.

<sup>1</sup> Corresponding Author; Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Nutrition and Food Technology Sabzevar University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Email: aliakbarifa@gmail.com

<sup>2</sup> Professor, Department of Human Nutrition, School of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

<sup>3</sup> Assistant Professor, Department of Human Nutrition, School of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.