

## **Prevalence of microbial contamination of traditional ice-creams in ice-cream supplier trade units in Birjand in 2015**

**Mohadeseh Abolhasannezhad<sup>1</sup>, Gholamreza Sharifzadeh<sup>2</sup>, Kobra Naseri<sup>3</sup>, Azarmdokht Abedi<sup>4</sup>, Saeed Yosefi<sup>4</sup>, Atefeh Nakhaei<sup>4</sup>**

Traditional ice-cream is a type of ice-cream whose all processes of production and distribution are done by hand. The present study aimed at assessing the prevalence of bacterial contamination of traditional ice creams and its decisive factors.

The current study was a descriptive cross-sectional one in Birjand in 2015. The samples were transferred under sterile conditions and cold chain, to a food laboratory. They went through laboratory tests of Enterobacteriaceae bacteria, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus Cocos. The obtained results were analyzed using SPSS statistical software( V:15).

The results showed that from among 96 samples collected 25 samples were acceptable while 71 samples were unusable. Maximum contaminations were due to Enterobacteriaceae in 39 cases (40%), and Staphylococcus aureus infection was found in 27 cases, (28%) the least contamination-14 (15%) cases - belonged to E. coli . In addition 39 infection (42.4%) 8 (8.69%) was because of coliforms. Besides, 8 cases were simultaneously contaminated with coliforms, escherichia coli and staphylococcus aureus, 12 samples (13.04%) with coliforms, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus; and 2 samples (2.17%) were simultaneously contaminated with coliforms and E. coli.

Birjand traditional ice-creams are highly contaminated with bacteria, which is a sign of poor hygiene in the preparation and distribution of this product.

**Key Words:** Traditional ice-cream, Microbial contamination.

*Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2017; 24 (1): 73-78.*

*Received: July 26, 2016*

*Accepted: May 10, 2017*

---

<sup>1</sup> Corresponding Author; MSc of Food Science and Industry, Metabolism and Antioxidants Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

Email: m\_abolhasannezhad@yahoo.com Tel: +985632395779 Fax:+985632395779

<sup>2</sup> Social Determinant of Health Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

<sup>3</sup> Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

<sup>4</sup> Employee, Food and Drugs Laboratory, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

## بررسی شیوع آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی در واحدهای صنفی عرضه‌کننده بستنی سنتی شهر بیرجند در سال 1394

محدثه ابوالحسن نژاد<sup>۱</sup>, غلامرضا شریف‌زاده<sup>۲</sup>, کبیری ناصری<sup>۳</sup>,

آذرمدخت عابدی<sup>۴</sup>, سعید یوسفی<sup>۴</sup>, عاطفه نخعی<sup>۴</sup>

### چکیده

در مناطق گرمسیری مصرف بستنی از حجم بالایی برخوردار بوده، فلذًا وضعیت بهداشتی آن همواره از اهمیت برخوردار می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع آلودگی میکروبی در بستنی‌های سنتی و عوامل مؤثر در آن بود.

این مطالعه از نوع توصیفی (مقطعی) بوده که در آن واحدهای صنفی عرضه‌کننده بستنی سنتی شهر بیرجند در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در شرایط استریل و زنجیره سرما به آزمایشگاه مواد غذایی انتقال داده شد. در آزمایشگاه طبق استاندارد میکروبی بستنی سنتی، آزمون‌های انتروباکتریاسه، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس روی آنها انجام گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که از تعداد 96 نمونه بستنی سنتی جمع‌آوری شده از سطح شهر، 25 نمونه قابل قبول و 71 نمونه غیر قابل مصرف بودند. بیشترین آلودگی مربوط به آلودگی با باکتری‌های انتروباکتریاسه با 39 نمونه (40%) و سپس 27 نمونه مربوط به آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس (28%) بود. کمترین میزان آلودگی نیز مربوط به اشرشیاکلی با 14 نمونه (15%) گزارش شد. 39 آلودگی (42/4) مربوط به کلی فرم بود. همچنین 8 نمونه به طور همزمان به کلی فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، 12 نمونه (13/04) به طور همزمان به کلی فرم و استافیلوکوکوس اورئوس و 2 نمونه (2/17) به طور همزمان به کلی فرم و اشرشیاکلی آلود بودند.

بستنی‌های سنتی شهر بیرجند، آلودگی به نسبت بالایی به باکتری‌ها دارند که نشانه عدم رعایت موادین بهداشتی مناسب در تهیه این فرآورده است.

واژه‌های کلیدی: بستنی سنتی، پاتوژن‌های بیماری‌زا، آلودگی میکروبی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1396؛ 24(1): 73-78.

دربافت: 1395/05/05 پذیرش: 1396/02/20

<sup>۱</sup> نویسنده مسؤول؛ کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات متابولیسم و آنتی‌اکسیدان، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

آدرس: بیرجند- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- معاونت غذا و دارو

تلفن: +98563235779 نامبر: +98563235779 پست الکترونیکی: m\_abolhasannezhad@yahoo.com

<sup>2</sup> مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

<sup>3</sup> گروه داروسازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

<sup>4</sup> کارشناس آزمایشگاه غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

## مقدمه

آلوده به اشرشیاکلی و 7 نمونه (5/9%) آلوده به استاف بودند (3). مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی در واحدهای صنفی عرضه‌کننده بستنی سنتی شهر بیرجند انجام شد.

## روش تحقیق

این مطالعه از نوع توصیفی (مقطعي) بوده و نمونه‌های مورد مطالعه، بستنی‌های سنتی توزیع شده در سطح شهر بیرجند بود. نمونه‌گیری نیز به صورت مبتنی بر هدف انجام شد.

روش کار بدین صورت بود که یک نفر کارشناس بهداشت محیط در ماههای مختلف فصل تابستان سال 1394، به تمام مراکز تهیه و توزیع بستنی در بیرجند مراجعه و از هر مرکز مقدار 200 تا 250 گرم بستنی جمع‌آوری نمود. بستنی‌های جمع‌آوری شده طی شرایط استریل (در ظرف‌های استریل) و حفظ زنجیره سرما، به آزمایشگاه انتقال داده شد. در آزمایشگاه طبق استاندارد میکروبی بستنی سنتی بر اساس استانداردهای شماره 1-2461، 6806 و 5234 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، آزمون‌های انترباکتریاسه، اشرشیاکلی و استافیلوکوک روی بستنی‌ها انجام و نتایج ثبت گردید. بدین منظور پس از ورود نمونه به آزمایشگاه، ابتدا در شرایط کاملاً استریل (فضا و لوازم مورد نیاز) از نمونه، رقت‌های مورد نیاز تهیه شد. سپس 10 گرم نمونه در 90 سی‌سی رینگر حل شد (0/1 قلت). برای تهیه رقت‌های موردنیاز بالاتر، یک سی‌سی از رقت پایین با 9 سی‌سی رینگر مخلوط گردید. در ادامه یک سی‌سی از رقت‌های تهیه شده در محیط‌های انتخابی که در استاندارد ذکر شده، کاملاً پخش و یکنواخت گردید. در مرحله بعد محیط‌های کشت به مدت 24-48 ساعت انکوبه شد. پس از این مدت، شمارش میکروبی توسط کلنی کانتر انجام و گزارش نهایی ارائه شد.

مواد غذایی یکی از منابع مهم ایجاد آلودگی توسط عوامل شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد؛ به طوری که تخمین زده می‌شود 70 درصد بیماری‌های عفونی از طریق غذای ناسالم به انسان سرایت می‌کند و بیشتر از 450 نوع بیماری ویروسی، انگلی، قارچی و میکروبی از طریق غذاهایی که منشا حیوانی دارند، می‌توانند به انسان منتقل شود (1). بستنی به دلیل محیط مغذی، PH=6-7 و دوره طولانی نگهداری، می‌تواند محیط بسیار مناسبی برای رشد میکرووارگانیسم‌ها باشد (2). از بین مواد غذایی، بستنی‌های سنتی به علت درصد بالای فسادپذیری شیر و نیز به دلیل اینکه فرآیندهای تولید آنها در اماکن و مغازه‌های سطح شهر به صورت دستی و ماشینی انجام می‌شود، در معرض خطر بالای آلودگی هستند (3).

تعیم‌آبادی و همکاران در تابستان سال‌های 1386 و 1387، به بررسی میکروبی بستنی‌های سنتی و آبمیوه‌های دست‌ساز در واحدهای صنفی قنادی و آبمیوه‌فروشی پرداختند. آنها پس از بررسی 20 مرکز توزیع و تهیه بستنی سنتی و 8 مرکز آبمیوه‌فروشی سنتی، به این نتیجه رسیدند که 58 درصد بستنی‌ها به اشرشیاکلی، 95 درصد به کلیفرم و 80 درصد به استافیلوکوکوس آلوده بودند (4). در بررسی انجام شده در شهر مشهد به طور تصادفی تعداد 100 نمونه بستنی سنتی از مراکز تولید و توزیع این فرآورده، از مناطق مختلف شهر مشهد جمع‌آوری و به منظور بررسی میزان آلودگی باکتریایی، مورد آزمایش قرار گرفت. در این بررسی مشخص شد که 91 درصد از نمونه‌ها دارای آلودگی بیش از حد مجاز ( $>5\times5\text{gr}/10\text{ gr}$ ) بودند (5). در بررسی انجام شده در شهرستان رشت در سال 1388 که توسط دباغ‌مقدم و همکاران در مورد بررسی باکتری‌شناختی بستنی‌های سنتی در مراکز تولید و توزیع در سطح شهرستان انجام شد، به این نتیجه رسیدند که از مجموع 1230 نمونه، 74 نمونه (38/3%) از نظر شمارش باکتری‌های هوایی و 61 نمونه (50/8%) از نظر شمارش کلیفرم بیش از حد مجاز بودند؛ همچنین 12 نمونه (10%)

## یافته‌ها

جدول ۱- فراوانی مطلق و نسبتی شیوع آلودگی در بستنی‌های سنتی شهرستان بیرجند در تابستان سال ۱۳۹۴

نوع آلودگی	تعداد کل نمونه‌ها	تعداد نمونه‌های آلوده	درصد آلودگی
شمارش کلی باکتریایی	96	71	73/95
شمارش انتربوکاتریاسه	96	39	40
اشرشیاکلی	96	14	15
استافیلوکوس اورئوس	96	27	28
کلی فرم + اشرشیاکلی + استافیلوکوس اورئوس	96	8	8/69
کلی فرم + استافیلوکوس اورئوس	96	12	13/04
کلی فرم + اشرشیاکلی	96	2	2/17

برابر نتایج مطالعه حاضر است. با توجه به اینکه این باکتری ممکن است از طریق تماس دست با بینی و دهان در حین تهیه بستنی منتقل شود، بنابراین رعایت بهداشت فردی در جلوگیری از این آلودگی نقش مهمی دارد (7).

نتایج به دست آمده در خصوص آلودگی بستنی‌های سنتی به اشرشیاکلی نشان داد که 15 درصد نمونه‌ها به این باکتری آلوده بودند. این مقدار نسبت به مطالعات انجام شده در برخی از شهرها که گزارش‌های بالاتری را ارائه داده‌اند، کمتر می‌باشد (8، 9). از آنجایی که اشرشیاکلی، شاخص آلودگی مدفعی بوده و آلودگی زیاد به این باکتری می‌تواند نشان‌دهنده عدم شستشوی صحیح دست‌ها و عدم استفاده از دستکش در مراکز تهیه و توزیع باشد، این امر ضرورت کنترل دقیق‌تر مراقبین بهداشتی را آشکار می‌سازد (8).

بیشترین میزان آلودگی در این مطالعه مربوط به انتربوکاتریاسه (39%) بود که با مطالعه انجام شده توسط مختاریان و همکاران در مشهد همخوانی دارد (5)؛ ولی با مطالعه مشابهی که مختاریان در گناباد انجام داد، تفاوت زیادی دارد (8). مقدار انتربوکاتریاسه در مطالعه حاضر تقریباً نصف مقدار گزارش شده در مطالعه مختاریان و همکاران است. احتمالاً عدم توجه به رعایت مواظین بهداشتی در طول روند تولید و عدم توجه به روند اعمال حرارت کافی بر روی مخلوط اولیه بستنی، از علل افزایش این آلودگی می‌باشد.

تولیدکنندگان بستنی سنتی، به دلیل نداشتن امکانات لازم

از تعداد 96 نمونه بستنی سنتی جمع‌آوری شده از سطح شهر، 25 نمونه قابل قبول و 71 نمونه غیر قابل مصرف گزارش شد. جدول یک، میزان آلودگی بستنی‌های سنتی در تابستان سال 1394 را نشان می‌دهد. شمارش میزان کلی باکتریایی 45/83 درصد گزارش شد. بیشترین آلودگی مربوط به باکتری‌های انتربوکاتریاسه 39 نمونه (40%) و سپس 27 نمونه (28%) مربوط به آلودگی استافیلوکوس اورئوس بود. کمترین میزان آلودگی نیز مربوط به اشرشیاکلی با 14 (15%) نمونه بود. 39 آلودگی (42/4%) مربوط به کلی فرم بود. همچنین 8 (8/69%) نمونه به طور همزمان به کلی فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوس اورئوس، 12 نمونه (13/04%) به طور همزمان به کلی فرم و استافیلوکوس اورئوس و 2 نمونه (2.17%) به طور همزمان به کلی فرم و اشرشیاکلی آلوده بودند.

## بحث

در این مطالعه 28 درصد نمونه‌ها آلوده به باکتری استافیلوکوس اورئوس بودند که این نتیجه مشابه نتایج مطالعه سادات‌امامی و همکاران در کرمانشاه (6) می‌باشد. رضایی و همکاران، آلودگی باکتریایی بستنی‌های سنتی و پاستوریزه شهر اراک در تابستان و پاییز 1390 را مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه آنها 50 درصد نمونه‌های بستنی به استافیلوکوس اورئوس آلوده بودند که نتایج آن تقریباً دو

به علت دارابودن اکثر عناصر و ترکیبات غذایی، محیط بسیار خوبی برای رشد و فعالیت بسیاری از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا می‌باشند. بنابراین عدم رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری فرآورده‌های شیر، عوارض و خطرات بهداشتی عدیده‌ای برای مصرف کنندگان این قبیل مواد غذایی به همراه خواهد داشت. علت آلودگی بستنی‌های سنتی را می‌توان به رعایت نکردن بهداشت فردی و همچنین استفاده از مواد اولیه با آلودگی میکروبی بالا نسبت داد.

### نتیجه‌گیری

با توجه به یافته‌های این مطالعه و اهمیت بستنی سنتی و رواج مصرف آن در میان مردم، نظارت بهداشتی بر روند تهیه و توزیع این محصول ضروری به نظر می‌رسد. رعایت اصول بهداشت، پاستوریزاسیون شیر، استفاده از آب بهداشتی، نظارت بر کار تولید کنندگان و فروشنده‌گان بستنی سنتی و ارائه آموزش‌های بهداشتی به آنان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت بهداشتی و کاهش آلودگی باکتریایی بستنی سنتی داشته باشد.

### تقدیر و تشکر

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی شماره 1106 مصوب معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با کد اخلاقی IR.BUMS.REC.1394.394 می‌باشد.

عمل پاستوریزاسیون را انجام نمی‌دهند. تهیه کنندگان این محصول نیز شیر را به اندازه کافی نمی‌جوشانند و فقط مبادرت به گرم کردن آن می‌کنند که این امر خود سبب آلودگی بیشتر بستنی می‌گردد (10). از آنجایی که این باکتری‌ها در دستگاه گوارش، ادراری و همچنین در آب و خاک وجود دارند، بنابراین رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی و استفاده از آب سالم می‌تواند نقش مؤثری در کاهش میزان آلودگی داشته باشد (11).

در مطالعه‌ای که توسط صالحیان و همکاران در تابستان 1391 بر روی 50 نمونه بستنی سنتی و مواد اولیه آن، دست کارگران، ظرف بستنی و اسکوپ نمونه‌گیری انجام شد، ارتباط معنی‌داری بین آلودگی بستنی و مواد اولیه آن شامل: شیر، شلپ، شکر و وانیل یافت شد. اگر چه پاستوریزه کردن شیر می‌تواند سبب از میان رفتن بسیاری از پاتوژن‌های خطرناک شود، اما آلودگی میکروبی می‌تواند در نتیجه افروden مواد اولیه، مراحل حمل و نقل و یا از طریق ابزار و وسائل آلوده ایجاد شود.

بر اساس این مطالعه، کنترل بیشتر واحدهای تولیدی از نظر رعایت موازین بهداشتی، آموزش صحیح کارگران و استفاده از ماسک و دستکش در هنگام تولید، حمل و نقل و فروش، نگهداری مواد اولیه در شرایط مناسب و بهداشتی و رعایت زنجیره سرد در تولید، ضروری به نظر می‌رسد (9). شیر و فرآورده‌های آن به لحاظ دارابودن ارزش غذایی بالا، در تغذیه انسان دارای نقش بهسزایی هستند؛ از سوی دیگر

### منابع:

- 1- Marandi A. Health in the Islamic Republic of Iran. Tehran: UNICEF; 1998. [Persian].
- 2- Kanbakan U, Con AH, Ayar A. determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. Food Control 2004; 15(6): 463-70.
- 3- Dabbagh Moghaddam A, Madad jrhandeh S, Akarein H, Ghanbari sagharlou N. A bacteriological survey on traditional ice cream in retaileras of Rasht (Guilan province, North of Iran) in spring of 2009. Journal of Veterinary Laboratory Research. 2011; 2(2): 141-50. [Persian]
- 4- Naimabadi A, Mirzaie R, Yazdani A, Armat M, Betalbelouie M, Yarahmadi M. Microbial evaluation of traditional icecream and juice in Bojnoure at summer in 86-87. J North Khorasan Univ Med Sci. 2010; 2(2-3): 45-50. [Persian]

- 5- Mokhtarian H, Mohsenzadeh M, Khezri M. The survey on the bacterial contamination of traditional ice cream produced in Mashhad city. *Ofogh-e-Danesh*. 2004; 10(1): 42-6.
- 6- Emami S, Akya A, Hossain Zadeh A, Barkhordar S. Bacterial contamination of traditional ice creams in Kermanshah in 2008. *Iran J Med Microbiol*. 2013; 7(2): 59-62. [Persian]
- 7- Jay LS, Comar D, Govenlock LD. A video study of Australian domestic food-handling practices. *J Food Prot*. 1999; 62(11): 1285-96.
- 8- Mokhtarian Dalouei H, Shariatifar N, Mohammadzadeh Moghadam M, Ghahramani M. The survey on the bacterial contamination of traditional ice cream produced in Gonabad city. *Ofogh-e-Danesh*. 2009; 15(1): 45-51.
- 9- Salehian M, Salehifar E, Esfahanizadeh M, Karimzadeh L, Rezaei R, Molanejad M. Microbial contamination in traditional ice cream and Effective factors. *J Mazandaran Univ Med Sci*. 2013; 23(99): 18-33. [Persian]
- 10- Karim g, Razavilar V. akhndzadeh Basti A. Survey on the contamination of traditional Iranian ice cream with important bacteria associated with foodborn infection and intoxications. *J Vet Res*. 1995; 50(1-2): 71-7. [Persian]
- 11- Malekzadeh F. *Microbiology*. 2<sup>nd</sup> ed. Tehran: Tehran University Press; 1996. pp: 56-7. [Persian]