

## **Effect of resistance training and dark chocolate extract supplementation on the level of plasma Myogenic Factor 5 and muscle strength in the elderly**

**Soheil Biglari<sup>1</sup>, Abbas Ali Gaeni<sup>2</sup>, Farnoosh Mafi<sup>3</sup>**

**Background and Aim:** Catechins in dark chocolate can improve the reduction of muscle mass in the elderly due to the sarcopenia by the positive effect on muscle growth. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks resistance training and dark chocolate extract supplementation on the plasma levels of Myogenic Factor 5 (Myf5) and muscle strength in the older adults.

**Materials and Methods:** In this quasi-experimental study, 36 elderly adults (19 males, 17 females), were objectively selected and randomly divided into four groups: training (RT) (n=8), supplement (S) (n=10), training + supplement (RT+S)(n=9), and control (C)(n=9). Subjects of RT and RT+S groups underwent a resistance training program. S and RT+S groups consumed capsules containing 500mg of dark chocolate extract –containing epicatechin- every day. Before and after eight weeks intervention, the plasma levels of Myf5 were measured by ELISA method and the muscle strength was measured by 1-Repeatation Maximum (1RM) test. The data were analyzed with ANOVA and LSD post hoc tests.

**Results:** Myf5 values increased significantly in RT, S and RT+S groups compared to C group after the intervention ( $P \leq 0.05$ ). Myf5 values were significantly higher in RT+S group compared to RT and S groups ( $P \leq 0.05$ ). Moreover, chest press and leg press maximal strength increased in RT and RT+S groups in comparison with C group ( $P \leq 0.05$ ).

**Conclusion:** 8-weeks resistance training with the consumption of dark chocolate extract supplement have more efficient effects on the enhancement of plasma myf5 in the older adults compared to mere resistance training.

**Key Words:** Sarcopenia, Epicatechin, Myogenic Factor 5

*Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2018; 25(2): 114-123.*

*Received: November 13, 2017 Accepted: May 27, 2018*

---

<sup>1</sup> MS.C in Exercise Physiology Physical Education, Faculty of and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

<sup>2</sup> Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

<sup>3</sup> Corresponding Author; MS.C in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. Tel: 09183318578 Fax: 02188021527 E-mail: Farnoosh.mafi@ut.ac.ir

## تأثیر تمرين‌های مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر میزان عامل میوژنیک ۵ پلاسمایی و قدرت عضلانی سالمدان

سهیل بیگلری<sup>۱</sup>، عباسعلی گائینی<sup>۲</sup>، فرنوش مافی<sup>۳</sup>

### چکیده

زمینه و هدف: کاتچین‌های موجود در شکلات تلخ می‌توانند با تأثیر مثبت بر عوامل رشد عضلانی، کاهش توده عضلانی ناشی از سارکوپنیا در سالمدان را بهبود بخشدند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرين مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر مقادیر عامل میوژنیک ۵ (Myf5) پلاسمایی و قدرت عضلانی در سالمدان بود.

روش تحقیق: در این پژوهش نیمه‌تجربی، ۳۶ سالمدان (۱۹ مرد و ۱۷ زن) بهصورت هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی به چهار گروه تمرين (۸ نفر)، مکمل (۱۰ نفر)، تمرين+مکمل (۹ نفر) و کنترل (۶ نفر) تقسیم شدند. افراد گروه‌های تمرين و تمرين+مکمل در یک برنامه تمرينی مقاومتی شرکت کردند. افراد گروه‌های مکمل و تمرين+مکمل، کپسول‌های حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم عصاره شکلات تلخ - حاوی اپی کاتچین - را بهطور روزانه مصرف کردند. قبل و بعد از ۸ هفته مداخله، سطوح MyF5 پلاسما بهروش الایزا و قدرت عضلانی از طریق آزمون یک تکرار بیشینه (RM1) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های واریانس یک‌طرفه و تعقیبی LSD ارزیابی شد.

یافته‌ها: پس از مداخله، مقادیر Myf5 در گروه‌های تمرين، مکمل و تمرين+مکمل در مقایسه با گروه کنترل بهصورت معنی‌داری افزایش یافت ( $P < 0.05$ ). مقادیر Myf5 در گروه مکمل+تمرين در مقایسه با گروه تمرين و گروه مکمل بهصورت معنی‌داری بیشتر بود ( $P < 0.05$ ). همچنین، قدرت حداکثر پرس سینه و پرس پا، در گروه‌های تمرين و تمرين+مکمل در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت ( $P < 0.05$ ).

نتیجه‌گیری: انجام تمرين مقاومتی بههمراه مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بهمدت ۸ هفته، بهنهایی آثار بهینه‌تری در افزایش myf5 پلاسمای سالمدان در مقایسه با انجام تمرين مقاومتی دارد.

واژه‌های کلیدی: سارکوپنیا، اپی کاتچین، عامل میوژنیک

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی پیرجند. ۱۳۹۷؛ ۲۵(۲): ۱۱۴-۱۲۳.

دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۲ پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۶

\*کد ثبت کارآزمایی بالینی: IRCT2016120131180N1

<sup>۱</sup> کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

<sup>۲</sup> استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

<sup>۳</sup> نویسنده مسؤول: کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

آدرس: تهران - دانشگاه تهران - دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تلفن: ۰۹۱۸۳۳۱۸۵۷۸ - نمایر: ۰۲۱۸۰۲۱۵۲۷ - پست الکترونیکی: Farnoosh.mafi@ut.ac.ir

## مقدمه

شاخص فعال‌سازی سلول‌های ماهواره‌ای شناخته می‌شود (۴). به منظور کنترل و درمان سارکوپنیا، اقداماتی که بتواند بر عوامل مهم مرتبط با رشد عضله اسکلتی مانند MyF5 تأثیرگذار باشد، مورد توجه است (۳، ۵، ۶). از جمله این اقدامات، فعالیت ورزشی و تعزیه می‌باشد (۷، ۸). مطالعات نشان می‌دهند، در بین انواع فعالیت‌های ورزشی، تمرین مقاومتی بیشترین میزان اثربخشی را بر MyF5 دارد (۹-۷). به علاوه فعالیت ورزشی، نشان داده شده است که مداخلات تعزیه‌ای نیز بر این عوامل تأثیرگذار است (۶). از جمله این اقدامات می‌تواند مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ که حاوی فلاونول اپی‌کاتچین است، باشد (۱۰).

کاتچین‌ها مولکول‌هایی از خانواده فلاونوئیدها هستند که فراوان در شکلات تلخ وجود دارند. طبق ادعاهای جدید، این مولکول‌ها می‌توانند بر عوامل رشد عضلانی تأثیر مثبت داشته باشند. به نظر می‌رسد، کاتچین‌ها می‌توانند با تقلید آثار هورمون‌های آنдрودئنالین، گیرنده‌های مربوط به عوامل رشد عضله را تحریک کنند (۱۱-۱۳). در این رابطه، Gutierrez-Salmean و همکاران (۲۰۱۴) در یکی از محدود مطالعاتی که تأثیر مصرف کاتچین‌ها بر MRF‌ها را بررسی کرده است، گزارش کردند که مصرف مکمل اپی‌کاتچین به مدت یک هفته، تأثیر مثبت معنی‌داری بر مقادیر پروتئین بافت و سرم عوامل هیپرتروفی از جمله Myf5 در موش‌ها و افراد جوان و سالماند دارد (۱۴). با وجود این، تأثیر همزمان تمرین مقاومتی و مصرف عصاره شکلات تلخ بر MRF‌ها در افراد سالماند معلوم نیست.

مطالعات نشان می‌دهند، عضله سالماندان در مقایسه با عضله افراد جوان، به تحریکات آتابولیکی مانند فعالیت ورزشی مقاومتی کمتر پاسخ می‌دهد (۱۴-۱۶)؛ برای مثال Kosek و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند، ۱۶ هفته تمرین مقاومتی مقادیر Myf5 جوانان (۲۰ تا ۳۵ سال) را به صورت معنی‌داری افزایش داد، در حالی که هیچ تغییر معنی‌داری در مقادیر Myf5 سالماندان (۶۰ تا ۷۵ سال) مشاهده نشد (۱۵).

مهم‌ترین تغییر وابسته به سالماندی، سارکوپنیا<sup>۱</sup> می‌باشد که کاهش توده، قدرت و توان عضلانی هنگام سالماندی طبیعی تعریف می‌شود (۱). سارکوپنیا به این دلیل مهم است که کاهش توده و قدرت عضلانی با کاهش توانایی انجام کارهای روزمره مانند بلندشدن از روی صندلی، راه‌رفتن با سرعت مناسب، سستی و ناتوانی، افتادن‌ها و حتی افزایش خطر مرگ همراه است (۲). سارکوپنیا باعث تغییرات زیادی در بدن می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها اختلال در بازسازی عضلانی است. مطالعات نشان می‌دهند، بازسازی عضله پس از آسیب یا آتروفی در سالماندان به خوبی جوانان انجام نمی‌شود. این رخداد با کاهش تعداد سلول‌های ماهواره‌ای<sup>۲</sup> همراه است و دلیل احتمالی آن اختلال در پاسخ سلول‌های ماهواره‌ای به آسیب است (۳).

سلول‌های ماهواره‌ای، سلول‌های بنیادی ساکن در عضله اسکلتی هستند که در پاسخ به محرك‌های مختلفی مانند: کشش، ویریشن و تمی مقاومتی فعال می‌شوند. با فعال‌شدن سلول‌های ماهواره‌ای، عوامل تنظیمی میوژنیک MRFs ( شامل: MyoD، Myf5، میوژنین و MRF4 ) افزایش یافته و با پیش‌بردن مراحل تکامل عضله‌زاوی، باعث بازسازی و رشد عضله می‌شوند. مراحل تکامل عضله‌زاوی به این صورت است که ابتدا MyoD و Myf5 در سلول‌های ماهواره‌ای فعال شده - به نام میوبلاست‌های مشتق از سلول‌های ماهواره‌ای - بیان می‌شوند و سپس تکثیر می‌یابند. در نهایت میوژنین و MRF4 در سلول‌های ماهواره‌ای تمايزیافته تولید می‌شوند و جوش خوردن میوبلاست‌های تکنوكلئوتیدی را به میوبلاست‌های چندنکلئوتیدی - پیش‌سازهای تارهای عضلانی - تنظیم می‌کنند. در بین MRF‌ها، Myf5 و MyoD در شروع فرآیند ایجاد و توسعه عضله اسکلتی، نقش کلیدی ایفا می‌کنند و بیان آنها به عنوان

<sup>1</sup> Sarcopenia

<sup>2</sup> Satellite cells

و روانی بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل: عدم تمایل به ادامه کار و ابتلا به آسیب‌های عضلانی و مفصلی (مانند: درد عضلانی) بود.

#### طرح مطالعه:

پیش از شروع مطالعه، در جلسه‌ای با حضور همه افراد شرکت‌کننده و پزشک، اهداف و روش اجرای پژوهش تشریح و به همه افراد دعوت‌نامه‌ای دربردارنده اطلاعاتی در زمینه هدف و چگونگی اجرای پژوهش، فرم رضایت‌نامه و شرکت داوطلبانه و پرسشنامه سلامت و ریسک بیماری داده شد. پیش از شروع مداخله ۸ هفته‌ای، اطلاعات مربوط به سن، قد، وزن، شاخص توده بدنی (BMI) و قدرت بیشینه ثبت شد. به منظور اندازه‌گیری وزن، از ترازوی Seca ساخت کشور آلمان با دقت ۰/۰۱ کیلوگرم و برای اندازه‌گیری قد از قدستج Seca با دقت ۰/۱ سانتی‌متر استفاده شد. پس از اندازه‌گیری قد و وزن افراد، از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر قد (سانتی‌متر) به توان ۲، BMI آنها محاسبه گردید.

برای بررسی MyF5، از هر فرد مورد مطالعه در حالت ناشتا (بین ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰)، پنج سی‌سی خون از ورید بازویی گرفته شد. مدت ۴۸ ساعت پس از خون‌گیری پیش‌آزمون، گروه‌های تمرین و تمرین+مکمل، به مدت هشت هفته پروتکل تمرینی منتخب را انجام دادند. همچنین افراد گروه‌های مکمل نیز در همین دوره هشت هفته‌ای، به صورت روزانه مکمل‌های در نظر گرفته شده را در ساعت مشخصی از روز مصرف کردند. دو روز پس از آخرین جلسه تمرینی؛ وزن، BMI و قدرت بیشینه افراد اندازه‌گیری و در حالت ناشتا (بین ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰) به طور مجدد خون‌گیری به همان روش پیش‌آزمون انجام شد. نمونه‌های خونی در لوله‌های طبق پروتکل شرکت سازنده استفاده شد. غلظت‌های

بنابراین، از آنجایی که پاسخ سالمدان به تمرین مقاومتی در مقایسه با جوانان کمتر است (۱۶-۱۴)، در این مطالعه تا آنجایی که می‌دانیم، برای اولین بار، تأثیر تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر MyF5 بررسی شد. فرض ما این است، مصرف عصاره شکلات تلخ - که پیش‌فاکتورهای لازم برای افزایش MyF5 را دارد - همراه با انجام تمرین مقاومتی در سالمدان می‌تواند پاسخ کمتر سالمدان به تمرین مقاومتی را جبران کند و باعث افزایش بیشتر مقادیر پلاسمایی MyF5 در سالمدان شود. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر MyF5 پلاسمایی سالمدان بود.

#### روش تحقیق

##### شرکت‌کنندگان:

در این مطالعه نیمه‌تجربی (کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و دوسویه‌کور) پس از اعلام فراخوان توسط آگهی، به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس، تعداد ۴۰ فرد سالمند انتخاب شدند. از این تعداد، ۲۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند و در محدوده سنی  $۲۰\pm ۸$  سال قرار داشتند. در ادامه، ۴ نفر به دلیل عدم همکاری، مسائل شخصی و بیماری از مطالعه حذف شدند؛ بنابراین در نهایت بررسی بر روی ۳۶ نفر انجام شد که به صورت تصادفی با استفاده از روش جدول اعداد تصادفی<sup>۱</sup> به چهار گروه: تمرین مقاومتی و پلاسیبو (۱۰ نفر، تمرین)، مصرف کننده مکمل عصاره شکلات تلخ (۱۰ نفر، مکمل)، تمرین مقاومتی و مکمل عصاره شکلات تلخ (۹ نفر، تمرین+مکمل) و یک گروه پلاسیبو (۹ نفر، کنترل) تقسیم شدند.

معیارهای ورود به مطالعه شامل: قرار گرفتن در دامنه سنی بین ۶۵ تا ۷۵ سال، کم تحرکی (شرکت‌نکردن در فعالیت‌های منظم ورزشی در ۱۲ ماه گذشته) و سلامت جسمی

<sup>2</sup> Ethylenediaminetetraacetic acid

<sup>1</sup> table of random numbers method

سرد کردن بهمدّت ۱۰ دقیقه با انجام حرکات کششی بود (۱۸). هر حرکت در سه نوبت و هر نوبت با ۸ تا ۱۲ تکرار انجام شد. تمرين‌ها با شدت ۶۰ تا ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه (1RM) انجام شد. استراحت بین ستها نیز ۹۰ ثانیه در نظر گرفته شده بود (۱۹). برای رعایت اصل اضافه‌بار، آزمون 1RM هر دو هفته یکبار برای هر کدام از افراد مورد مطالعه تکرار شد تا پیشرفتی که بر اثر تمرين در قدرت سالمدان ایجاد می‌شود، در تنظیم شدت این تمرين‌ها لحاظ شود. حداکثر قدرت پرس پا و پرس سینه افراد، پیش و پس از ۸ هفته مداخله، با استفاده از آزمون استاندارد 1RM مورد بررسی قرار گرفت (۲۰).

#### روش‌های آماری:

برای اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها، از آزمون شاپیرو-ولیک استفاده گردید. برای مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر گروه، از آزمون تی همبسته و برای مقایسه بین گروهی پیش‌آزمون و پس‌آزمون<sup>۴</sup> گروه از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد. برای مقایسه تأثیر تمرين مقاومتی، مکمل عصاره شکلات تلخ و ترکیب این دو بر متغیرهای مورد نظر، ابتدا مقدار تغییرات متغیرها (اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون) در هر گروه محاسبه شد؛ سپس آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت بین چهار گروه، مورد استفاده قرار گرفت. کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه ۲۲) انجام گرفت و سطح معنی‌داری برای تمامی عملیات آماری  $P \leq 0.05$  در نظر گرفته شد.

این مقاله برگرفته از بخشی از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران است و در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه تهران با کد اخلاق IR.UT.Rec.1395009 ثبت شده است. تصویب رسیده است. همچنین با توجه به بیانیه هلسینکی، در سایت کارآزمایی بالینی ([www.irct.ir](http://www.irct.ir)) با کد IRCT2016120131180N1

پلاسمایی پس‌آزمون MyF5 نسبت به تغییرات حجم پلاسمای با استفاده از هماتوکریت و هموگلوبین بر اساس معادلات دیل و کاستیل بیان شد (۱۷).

#### مکمل‌دهی:

افراد گروه‌های تمرين+مکمل و مکمل در همین دوره هشت هفته‌ای، روزانه یک کپسول ۵۰۰ میلی‌گرمی عصاره شکلات تلخ را با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب دریافت کردند (در حدود ساعت ۱۶:۰۰). این کپسول‌ها حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم عصاره دانه شکلات تلخ، ۱۲۵ میلی‌گرم فلاونول و ۲۵ میلی‌گرم اپی‌کاتچین (Futurebiotics, the USA) بود. مقدار مصرف مورد توصیه این مکمل بر اساس جدول RDA آن، روزانه یک کپسول بود. افراد گروه کنترل نیز در این مددت هیچ‌گونه فعالیت ورزشی نداشتند. برای کنترل تأثیر روانی مکمل، گروه‌های تمرين و کنترل در زمانی مشابه با گروه‌های مکمل و مکمل+تمرين، یک کپسول ۵۰۰ میلی‌گرمی دارونما (نشاسته) با شکل و رنگی مشابه کپسول‌های حاوی عصاره شکلات تلخ مصرف کردند (۱۴).

#### تمرين مقاومتی و آزمون قدرت حداکثر:

افراد گروه‌های تمرين، سه روز غیرمتوالی در هفته (بین ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰) بهمّدت هشت هفته برنامه تمرينی منتخب را با تجهیزات تمرين مقاومتی (Technogym, Italy) جلسه شامل: گرم‌کردن با انواع حرکات نرمشی و کششی بهمّدت ۱۰ دقیقه، انجام هشت حرکت پرس پا دستگاه<sup>۱</sup>، بازکردن زانو دستگاه<sup>۲</sup>، حرکت پشت ران دستگاه<sup>۳</sup>، پرس سینه با هالتر<sup>۴</sup>، پرس سرشاره دستگاه<sup>۵</sup>، قایقی دستگاه<sup>۶</sup>، جلو بازو دمبل<sup>۷</sup> و دراز و نشست<sup>۸</sup> بهمّدت ۴۵ دقیقه و در انتهای سرد کردن

<sup>1</sup> Leg Press

<sup>2</sup> Leg extension

<sup>3</sup> Leg curl

<sup>4</sup> Chest press

<sup>5</sup> Shoulder press

<sup>6</sup> Rowing

<sup>7</sup> Biceps curl

## یافته‌ها

افزایش معنی‌داری داشت ( $P < 0.05$ ) (جدول ۲). همچنین نتایج آزمون آماری نشان داد، بین مقادیر ویژگی‌های چهار گروه در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود نداشت ( $P > 0.05$ )؛ با وجود این، بین مقادیر MyF5 پس‌آزمون چهار گروه، تفاوت معنی‌داری یافت شد ( $P < 0.05$ ) (جدول ۲).

پس از هشت هفته مداخله؛ وزن، BMI و قدرت حداکثر در حرکات پرس سینه و پرس پا در گروه‌های تمرین و تمرین+مکمل در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت ( $P < 0.05$ )؛ با این وجود، هیچ تغییر معنی‌داری در وزن، قدرت حداکثر گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل BMI مشاهده نشد ( $P > 0.05$ ) (جدول ۳).

نتایج آزمون آماری نشان داد در ابتدای مطالعه، بین مقادیر ویژگی‌های فردی و مقادیر MyF5 چهار گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت ( $P > 0.05$ ) (جدول ۱ و ۲). نتایج آزمون تی‌همبسته نشان داد که پس از هشت هفته مداخله؛ مقادیر وزن، BMI و قدرت حداکثر در حرکات پرس سینه و پرس پا در پس‌آزمون در مقایسه با پیش‌آزمون در گروه‌های تمرین و تمرین+مکمل افزایش معنی‌داری پیدا کرد ( $P < 0.05$ ). مقادیر MyF5 در پس‌آزمون در گروه‌های تمرین، تمرین+مکمل و مکمل در مقایسه با پیش‌آزمون

جدول ۱- مقایسه میزان ویژگی‌های فردی چهار گروه در ابتدای مداخله (میانگین $\pm$ انحراف استاندارد)

P	بین‌گروهی پیش‌آزمون	تمرين+مکمل	مکمل	تمرين	کنترل	متغیر
--		۴/۵	۵/۵	۴/۴	۵/۴	تعداد (زن/مرد)
.۰/۹۱۹		۶۷/۳۹ $\pm$ ۷/۱۵	۶۸/۸۲ $\pm$ ۶۴/۰۵	۶۷/۱۰ $\pm$ ۶/۱۷	۶۶/۵۶ $\pm$ ۲/۰۹	سن (سال)
.۰/۹۱۹		۱۷۰/۱۸ $\pm$ ۸/۵۴	۱۶۹/۷۱ $\pm$ ۹/۸۸	۱۶۷/۲۹ $\pm$ ۱۰/۲۱	۱۶۸/۱۸ $\pm$ ۱۴/۰۵	قد (cm)

جدول ۲- مقایسه میزان ویژگی‌های فردی و MyF5 چهار گروه در قبل و بعد از مداخله (میانگین $\pm$ انحراف استاندارد)

P	P	بین‌گروهی پیش‌آزمون	بین‌گروهی پس‌آزمون	تمرين+مکمل	مکمل	تمرين	کنترل	زمان اندازه‌گیری	متغیر
.۰/۹۵۳	.۰/۹۷۲			۷۱/۰۱ $\pm$ ۱۰/۵۷	۷۰/۳۰ $\pm$ ۱۰/۵۳	۶۸/۸۷ $\pm$ ۸/۸۷	۶۹/۶۶ $\pm$ ۷/۶۴	پیش‌آزمون	وزن (kg)
		۷۱/۶۶ $\pm$ ۱۰/۴۷	۷۰/۵۰ $\pm$ ۱۰/۵۶	۶۹/۵۰ $\pm$ ۸/۴۳	۶۹/۴۴ $\pm$ ۷/۱۹	۶۹/۴۴ $\pm$ ۷/۱۹	۶۹/۴۴ $\pm$ ۷/۱۹	پس‌آزمون	
		.۰/۰۰۴	.۰/۱۶۸	.۰/۰۴	.۰/۴۴۷	.۰/۴۴۷	.۰/۴۴۷	دون گروهی P	
.۰/۶۶۳	.۰/۶۸۵	۲۴/۰۵ $\pm$ ۲/۵۵	۲۴/۴۱ $\pm$ ۲/۲۸	۲۳/۲۰ $\pm$ ۱/۹۴	۲۳/۵۹ $\pm$ ۲/۰۶	۲۳/۵۹ $\pm$ ۲/۰۶	۲۳/۵۹ $\pm$ ۲/۰۶	پیش‌آزمون	BMI (kg.m <sup>-2</sup> )
		۲۴/۲۸ $\pm$ ۲/۴۸	۲۴/۴۸ $\pm$ ۲/۳۳	۲۳/۴۲ $\pm$ ۱/۸۸	۲۳/۵۲ $\pm$ ۱/۹۳	۲۳/۵۲ $\pm$ ۱/۹۳	۲۳/۵۲ $\pm$ ۱/۹۳	پس‌آزمون	
		.۰/۰۰۴	.۰/۱۷۰	.۰/۰۴	.۰/۴۵۸	.۰/۴۵۸	.۰/۴۵۸	دون گروهی P	
.۰/۳۳۵	.۰/۸۷۲	۳۵/۶۶ $\pm$ ۱۲/۳۰	۳۱/۷۰ $\pm$ ۱۰/۲۴	۳۲/۲۵ $\pm$ ۱۱/۳۷	۳۲/۱۱ $\pm$ ۱۰/۷۹	۳۲/۱۱ $\pm$ ۱۰/۷۹	۳۲/۱۱ $\pm$ ۱۰/۷۹	پیش‌آزمون	پرس سینه (kg)
		۴۰/۲۲ $\pm$ ۱۲/۲۷	۳۲ $\pm$ ۱۰/۱۹	۳۶/۷۵ $\pm$ ۱۱/۸۶	۳۲ $\pm$ ۱۰/۴۷	۳۲ $\pm$ ۱۰/۴۷	۳۲ $\pm$ ۱۰/۴۷	پس‌آزمون	
		.۰/۰۰۱	.۰/۲۷۹	.۰/۰۰۱	.۰/۶۸۱	.۰/۶۸۱	.۰/۶۸۱	دون گروهی P	
.۰/۲۰۶	.۰/۹۰۲	۸۵ $\pm$ ۲۶/۴۰	۷۷/۶۰ $\pm$ ۲۲/۱۵	۸۲/۲۵ $\pm$ ۲۴/۱۴	۷۷/۶۶ $\pm$ ۲۸/۰۷	۷۷/۶۶ $\pm$ ۲۸/۰۷	۷۷/۶۶ $\pm$ ۲۸/۰۷	پیش‌آزمون	پرس پا (kg)
		۱۰۱/۳۳ $\pm$ ۳۳/۵۴	۷۸/۳۰ $\pm$ ۲۲/۰۷	۹۶ $\pm$ ۳۱/۱۹	۷۷/۸۸ $\pm$ ۲۷/۶۱	۷۷/۸۸ $\pm$ ۲۷/۶۱	۷۷/۸۸ $\pm$ ۲۷/۶۱	پس‌آزمون	
		.۰/۰۰۱	.۰/۰۶	.۰/۰۰۲	.۰/۵۹۴	.۰/۵۹۴	.۰/۵۹۴	دون گروهی P	
.۰/۰۰۳	.۰/۹۸۲	۴/۹۵ $\pm$ ۰/۶۶	۴/۸۷ $\pm$ ۱/۰۱	۴/۹۵ $\pm$ ۱/۰۲	۵/۰۶ $\pm$ ۱/۲۷	۵/۰۶ $\pm$ ۱/۲۷	۵/۰۶ $\pm$ ۱/۲۷	پیش‌آزمون	MyF5 (ng/ml)
		۶/۷۴ $\pm$ ۰/۹۲	*۵/۴۹ $\pm$ ۰/۸۹	۶/۱۱ $\pm$ ۰/۷۲	۵/۰۶ $\pm$ ۱/۱۱	۵/۰۶ $\pm$ ۱/۱۱	۵/۰۶ $\pm$ ۱/۱۱	پس‌آزمون	
		.۰/۰۰۱	.۰/۰۰۳	.۰/۰۰۴	.۰/۹۸۸	.۰/۹۸۸	.۰/۹۸۸	دون گروهی P	

جدول ۳- مقایسه میزان تغییرات وزن، BMI، پرس سینه، پرس پا و MyF5 چهار گروه پس از ۸ هفته مداخله

سطح معنی‌داری	تغییرات (میانگین±انحراف استاندارد)				متغیر
	تمرین	مکمل	تمرین	کنترل	
.+/0.2	.+/66±0/.50*	.+/20±0/.42	.+/62±0/.74*	-.+/22±0/.83	وزن (kg)
.+/0.2	-.+/22±0/.16*	-.+/0.7±0/.15	-.+/22±0/.26*	.+/0.7±0/.27	(kg.m-2) BMI
.+/0.1	+/55±1/.01*	+/3.0±0/.82#†	+/5.0±1/.14*	.+/11±0/.78	پرس سینه (kg)
.+/0.1	+/6.33±7/.71*	+/7.0±1/.05#†	+/13.75±7/.92*	.+/22±1/.20	پرس پا (kg)
.+/0.1	+/17.79±0/.40*	+/6.2±0/.49#†	+/11.6±0/.79#*	.+/0.02±0/.44	(ng/ml) myf5

\* نشانه معنی‌داری آماری  $P \leq 0.05$  در مقایسه با گروه کنترل، # نشانه معنی‌داری آماری  $P \leq 0.05$  در مقایسه با گروه تمرین+مکمل،

† نشانه معناداری آماری  $P \leq 0.05$  در مقایسه با گروه تمرین (نتایج آزمون آنوا یک طرفه)

تأثیری بر قدرت عضلانی نداشته باشد. این در حالی است که در گروه تمرین+مکمل و تمرین+پلاسیبو، شاهد افزایش معنی‌دار قدرت حداکثر در هر دو حرکت پرس سینه و پرس پا بودیم.

در این مطالعه پس از تمرین ورزشی، سطوح پلاسمای MyF5 به صورت معنی‌داری در گروه تمرین افزایش پیدا کرد. ناهمسو با پژوهش حاضر، Kosek و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه بر روی سالمدان (۶۰ تا ۷۵ سال، ۱۲ زن و ۱۳ مرد) گزارش کردند، پس از ۱۶ هفته تمرین هیچ تغییر معنی‌داری در مقادیر MyF5 سالمدان مشاهده نشد (۱۵). به نظر می‌رسد، این یافته‌های ناهمسو به دلیل تفاوت در برنامه تمرینی باشد (۴). در پژوهش حاضر پروتکل تمرینی تقریباً بر روی تمامی عضلات اصلی بدن انجام می‌شد؛ در حالی که در پژوهش Kosek و همکاران تنها از حرکات تمرینی پایین‌تنه استفاده شده بود. تمرین مقاومتی با ایجاد ریزآسیب‌های عضلانی، سلول‌های ماهواره‌ای را فعال می‌کند. پس از فعال‌سازی سلول‌های ماهواره‌ای، بیان MRF‌ها از جمله MyF5 برای تکثیر و تمايز سلول‌های ماهواره‌ای افزایش می‌یابد که درنهایت به بازسازی و رشد عضله اسکلتی منجر می‌شود (۴).

در این پژوهش پس از مصرف ۸ هفته مکمل عصاره شکلات تلخ -حاوی اپی‌کاتچین- مقادیر پلاسمایی MyF5 به صورت معنی‌داری در گروه مکمل افزایش داشت. مطالعات نشان داده‌اند، مصرف مکمل اپی‌کاتچین تأثیرات مثبتی بر

پس از هشت هفته مداخله، مقادیر MyF5 در گروه‌های تمرین، تمرین+مکمل و مکمل در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت ( $P < 0.05$ ). همچنین، مقادیر MyF5 گروه تمرین در مقایسه با گروه مکمل به صورت معنی‌داری افزایش داشت ( $P < 0.05$ ). مقادیر MyF5 گروه تمرین+مکمل در مقایسه با سایر گروه‌ها به صورت معنی‌داری بیشتر بود ( $P < 0.05$ ) (جدول ۳).

## بحث

در این مطالعه، تأثیر هشت هفته تمرين مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر MyF5 پلاسما در سالمدان بررسی شد. نتایج نشان داد پس از هشت هفته مداخله، مقادیر MyF5 پلاسما در هر سه گروه تجربی (تمرین، مکمل و تمرین+مکمل) در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری پیدا کرد.

یافته اصلی این مطالعه، افزایش قابل ملاحظه مقادیر پلاسمایی MyF5 در گروه تمرین+مکمل در مقایسه با گروه تمرین و گروه مکمل بود. پس از مداخله، همزمان با افزایش MyF5، قدرت حداکثر در حرکت پرس سینه و پرس پا در گروه‌های تمرین و تمرین+مکمل در مقایسه با گروه کنترل و مکمل افزایش معنی‌داری یافته بود؛ اما با وجود افزایش معنی‌دار مقادیر MyF5 در گروه مکمل، تفاوتی در قدرت حداکثر پرس سینه و پرس پا این گروه در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. به نظر می‌رسد، مصرف مکمل به تنها یکی

رشدی همچون IGF-1 و MGF، آثار بهتری در مقایسه با مکمل عصاره شکلات تلخ داشته باشد. گزارش شده است، تمرين ورزشی بهدلیل داشتن تأثیرات فیزیولوژیک بیشتر و بدون عوارض جانبی، نسبت به دارو درمانی برتری دارد. در حال حاضر، استراتژی استفاده از مکمل تغذیه‌ای مناسب و ترکیب آن با تمرين مقاومتی، به نظر می‌رسد که بهترین رویکرد در پیشگیری یا حتی تا حدودی درمان سارکوپنیا باشد (۶).

از سوی دیگر، در رابطه با افزایش قدرت حداکثر در حرکات پرس سینه و پرس پای افراد دو گروه تمرين+پلاسیبو و تمرين+مکمل باید اشاره کرد، توسعه قدرت شامل عملکرد هماهنگ چندین فرآیند می‌باشد. در واقع قابلیت تولید نیروی بیشینه، هم به سیستم عصبی و هم به سیستم عضلانی نسبت داده می‌شود. سازگاری‌های ایجادشده در نتیجه تمرين مقاومتی که به افزایش قدرت بیشینه منجر می‌شود، شامل سازگاری‌های عصبی مانند: افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی، به کارگیری واحدهای حرکتی در عضلات موافق، تحریک واحدهای حرکتی با تواتر بیشتر، مهار خودبه‌خودی و افزایش مهارت و هماهنگی عصبی-عضلانی در انجام حرکات، سازگاری‌های عضلانی مانند افزایش سطح مقطع عرضی عضله و تغییر در ساختار عضله و همچنین سازگاری‌های متابولیکی می‌باشد (۲۵، ۲۶).

با این حال، با وجود تأثیرات و سازوکارهای به اثبات رسیده تمرين مقاومتی بر رشد عضله اسکلتی، همانطور که پیش‌تر بیان شد مکانیزم دقیق تأثیر مکمل اپی‌کاتچین بر افزایش عوامل مرتبط با رشد عضله هنوز مشخص نمی‌باشد. بنابراین، از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به عدم امکان سنجش عوامل و فاکتورهای بیشتری در ارتباط با رشد عضله اسکلتی مانند: میوستاتین، فولیستاتین، FoxO، Smads، GASP و ... برای حصول اطمینان از تأثیر مکمل اپی‌کاتچین بر این عوامل و همچنین عدم استفاده از روش نمونه‌برداری عضلانی (بیوپسی)، برای اطمینان از تغییر مقادیر

کاهش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت نوع ۲، ظرفیت‌های تمرينی و آنزیوژن ز دارد (۲۱). اخيراً نشان داده است، این فلاونول بر روند رشد عضله اسکلتی نیز تأثیرگذار است (۲۲، ۲۳). Gutierrez-Salmean و همکاران (۲۰۱۴) گزارش کرده‌اند، پیری آثار سوء بر تنظیم کننده‌های رشد عضلانی دارد و مصرف فلاونول اپی‌کاتچین، تا حدی می‌تواند این تغییرات را معکوس کند (۱۴). همچنین، در پژوهشی دیگر نشان دادند که پس از هشت هفته مصرف مکمل اپی‌کاتچین در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی بیکر<sup>۱</sup>، مقادیر MyF5 افزایش و پاسخ عضلات به تمرين نیز در آن‌ها بهبود یافت. توضیح دقیقی در مورد سازوکار احتمالی اپی‌کاتچین بر افزایش مقادیر MyF5 ارائه نشده است. در پژوهشی گزارش کردنده، اپی‌کاتچین تنها مکمل خوراکی است که باعث بهبود متغیرهای مرتبط با بازسازی عضله اسکلتی مانند MyF5 می‌شود و می‌تواند به عنوان یک نشانگر زیستی داروشناسی برای مطالعات آینده باشد (۲۴). نظریه احتمالی موجود در مورد سازوکار فیزیولوژیک اپی‌کاتچین‌ها، تقلید شیمیایی از آثار هورمون جنسی است. این گمان وجود دارد که اپی‌کاتچین‌ها که گاهی از آنها به عنوان پروهورمون<sup>۲</sup> نیز یاد می‌شود، گیرنده‌های هورمون‌های جنسی را تحریک می‌کنند و با همان سازوکار احتمالی که هورمون‌های جنسی قادرند باعث افزایش عوامل میوژنیک شوند، اپی‌کاتچین‌ها نیز باعث افزایش عوامل میوژنیک می‌شوند (۱۱-۱۳).

پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر MyF5 گروه تمرين+مکمل در مقایسه با گروه تمرين و مکمل به صورت معنی‌داری بیشتر بود که به نظر می‌رسد آثار تمرين مقاومتی و اپی‌کاتچین به صورت هم‌زمان تأثیر بهتری دارد. به علاوه نشان داده شد، مقادیر MyF5 در گروه تمرين در مقایسه با گروه مکمل افزایش بیشتری به همراه داشت. به نظر می‌رسد تمرين مقاومتی از راه تحریک مکانیکی و افزایش عوامل

<sup>1</sup> Becker Muscular Dystrophy (BMD)

<sup>2</sup> Prohormone

پروتئین MyF5 در بافت عضله اسکلتی اشاره کرد. این موارد به عنوان چشم اندازی برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود.

چشم انداز جدیدی برای تنظیم فرآیند عضله زایی سالمندان، به ارگان آورد و ممکن است دیدگاه های جدیدی در مورد تنظیم رشد عضلات اسکلتی برای پیشگیری و حتی درمان مشکلات عضلانی سالمندان از قبیل سارکوپنیا ارائه نماید.

### تقدیر و تشکر

بدین وسیله از تمامی افرادی که در این پژوهش شرکت کردند، تشکر و قدردانی می شود.

### نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان می دهد که پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ، سطوح پلاسمایی myf5 افزایش می یابد. همچنین مشخص شد، تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ آثار بهینه تری در افزایش myf5 دارد. این نتایج می تواند

### منابع:

- 1- Moreland JD, Richardson JA, Goldsmith CH, Clase CM. Muscle weakness and falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. *J Am Geriatr Soc.* 2004 Jul; 52(7): 1121-9.
- 2- Kalinkovich A, Livshits G. Sarcopenia—The search for emerging biomarkers. *Ageing Res Rev.* 2015; 22: 58-71.
- 3- Carlson ME, Suetta C, Conboy MJ, Aagaard P, Mackey A, Kjaer M, et al. Molecular aging and rejuvenation of human muscle stem cells. *EMBO Mol Med.* 2009; 1(8-9): 381-91.
- 4- Bazgir B, Fathi R, Valojerdi MR, Mozdziak P, Asgari A. Satellite cells contribution to exercise mediated muscle hypertrophy and repair. *Cell J.* 2017; 18(4): 473-84.
- 5- Zanou N, Gailly P. Skeletal muscle hypertrophy and regeneration: interplay between the myogenic regulatory factors (MRFs) and insulin-like growth factors (IGFs) pathways. *Cell Mol Life Sci.* 2013; 70(21): 4117-30.
- 6- Woo J. Sarcopenia. *Clin Geriatr Med.* 2017;33(3):305-14.
- 7- Offord NJ, Witham MD. The emergence of sarcopenia as an important entity in older people. *Clin Med (Lond).* 2017;17(4):363-6.
- 8- Wilborn CD, Taylor LW, Greenwood M, Kreider RB, Willoughby DS. Effects of different intensities of resistance exercise on regulators of myogenesis. *J Strength Cond Res.* 2009; 23(8): 2179-87.
- 9- Smith HK, Maxwell L, Rodgers CD, McKee NH, Plyley MJ. Exercise-enhanced satellite cell proliferation and new myonuclear accretion in rat skeletal muscle. *J Appl Physiol* (1985). 2001; 90(4): 1407-14.
- 10- Yu PL, Pu HF, Chen SY, Wang SW, Wang PS. Effects of catechin, epicatechin and epigallocatechin gallate on testosterone production in rat Leydig cells. *J Cell Biochem.* 2010; 110(2): 333-42.
- 11- Goodin MG, Fertuck KC, Zacharewski TR, Rosengren RJ. Estrogen receptor-mediated actions of polyphenolic catechins in vivo and in vitro. *Toxicol Sci.* 2002; 69(2): 354-61.
- 12- Moreno-Ulloa A, Mendez-Luna D, Beltran-Partida E, Castillo C, Guevara G, Ramirez-Sanchez I, et al. The effects of (-)-epicatechin on endothelial cells involve the G protein-coupled estrogen receptor (GPER). *Pharmacol Res.* 2015; 100: 309-20.
- 13- Etters A. Regulation of the Estrogen Receptor via Catechin Polyphenols from Green Tea. 2015. Digital commons. Available at: [digitalcommons.butler.edu/](http://digitalcommons.butler.edu/) Accessed Jul 25, 2017.
- 14- Gutierrez-Salmean G, Ciaraldi TP, Nogueira L, Barboza J, Taub PR, Hogan MC, et al. Effects of (-)-epicatechin on molecular modulators of skeletal muscle growth and differentiation. *J Nutr Biochem.* 2014;25(1):91-4.
- 15- Kosek DJ, Kim JS, Petrella JK, Cross JM, Bamman MM. Efficacy of 3 days/wk resistance training on myofiber hypertrophy and myogenic mechanisms in young vs. older adults. *J Appl Physiol* (1985). 2006;101(2):531-44.

- 16- Bamman MM, Ragan RC, Kim JS, Cross JM, Hill VJ, Tuggle SC, et al. Myogenic protein expression before and after resistance loading in 26-and 64-yr-old men and women. *J Appl Physiol.* 2004;97(4):1329-37.
- 17- Dill DB, Costill DL. Calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma, and red cells in dehydration. *J Appl Physiol.* 1974;37(2):247-8.
- 18- Maltais ML, Ladouceur JP, Dionne IJ. The effect of resistance training and different sources of postexercise protein supplementation on muscle mass and physical capacity in sarcopenic elderly men. *J Strength Cond Res.* 2016; 30(6): 1680-7.
- 19- Mayer F, Scharhag-Rosenberger F, Carlsohn A, Cassel M, Müller S, Scharhag J. The intensity and effects of strength training in the elderly. *Dtsch Arztebl Int.* 2011; 108(21): 359-64.
- 20- Chrusch MJ, Chilibeck PD, Chad KE, Davison KS, Burke DG. Creatine supplementation combined with resistance training in older men. *Med Sci Sports Exerc.* 2001; 33(12): 2111-7.
- 21- Quine SD, Raghu PS. Effects of (-)-epicatechin, a flavonoid on lipid peroxidation and antioxidants in streptozotocin-induced diabetic liver, kidney and heart. *Pharmacol Rep.* 2005; 57(5): 610-5.
- 22- Latif R. Chocolate/cocoa and human health: a review. *Neth J Med.* 2013;71(2):63-8.
- 23- Hooper L, Kay C, Abdelhamid A, Kroon PA, Cohn JS, Rimm EB, et al. Effects of chocolate, cocoa, and flavan-3-ols on cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *Am J Clin Nutr.* 2012; 95(3): 740-51.
- 24- McDonald C, Henricson E, Oskarsson B, Aguilar C, Nicorici A, Joyce N, et al. Epicatechin enhances mitochondrial biogenesis, increases dystrophin and utrophin, increases follistatin while decreasing myostatin, and improves skeletal muscle exercise response in adults with Becker muscular dystrophy (BMD). *Neuromuscul Disord.* 2015; 25(Suppl 2): S314-5.
- 25- Howe L, Waldron M. Advanced resistance training strategies for increasing muscle hypertrophy and maximal strength: part 1 accumulation methods. *Professional Strength and Conditioning.* 2017;(47):7-13.
- 26- Figueiredo VC, de Salles BF, Trajano GS. Volume for Muscle Hypertrophy and Health Outcomes: The Most Effective Variable in Resistance Training. *Sports Med.* 2018; 48(3): 499-505.