

## اثر گنادوتروپین جفتی انسان بر تکوین فولیکول‌های تخدمانی موش نژاد cBalb

جواد بهارآرا<sup>۱</sup>، نزهت موسوی‌فر<sup>۲</sup>، محسن جلالی<sup>۳</sup>، فرزانه عدل<sup>۴</sup>

### چکیده

زمینه و هدف: در مطالعات تولید مثل و ناباروری و نیز مطالعات ژنتیکی، روش تحریک تخدمانی کنترل شده با استفاده از گنادوتروپین‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) بر تکوین فولیکول‌های تخدمانی موش نژاد cBalb بررسی شد.

روش تحقیق: در این پژوهش تجربی، ۳۰ سر موش ماده باکره ۲۱ روزه نژاد cBalb انتخاب و به سه گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی (تریک ۱/۰ میلی‌لیتر سالین نرمال) و تجربی (تریک ۱/۰ میلی‌لیتر هورمون گنادوتروپین جفتی انسان ۵IU/ml) تقسیم شدند. موش‌ها ۱۸ ساعت پس از تزریق توسط کلروفرم کشته شدند و تخدمان‌های آنها خارج و بررسی‌های اولیه ریخت‌شناسی و ثبت وزن و اندازه انجام شد؛ سپس به کمک مطالعات میکروسکوپی نوری تعداد فولیکول‌های اولیه، ثانویه، در حال رشد و نیز فولیکول‌های آنtraal اولیه هر نمونه بررسی و مقایسه شد. داده‌ها با استفاده از نرمافزار SPSS و آزمون‌های آماری ANOVA و Kolmogorov-Smirnov در سطح معنی‌داری  $P < 0.05$  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین سه گروه از نظر اندازه تخدمان، تعداد متوسط فولیکول‌های اولیه و ثانویه مشاهده نشد ( $P > 0.05$ ). تزریق hCG باعث افزایش معنی‌داری در وزن تخدمان‌ها و تعداد متوسط فولیکول‌های در حال رشد و فولیکول‌های آنtraal اولیه در مقایسه با گروه شاهد و شاهد آزمایشگاهی شد ( $P = 0.001$ ).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، اثر هورمون گنادوتروپین جفتی انسان بر روی افزایش میزان رشد فولیکول‌های تخدمان، در مراحل انتهایی بیشتر می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** گنادوتربین جفتی انسان، تخدمان، موش cBalb، تکوین فولیکولی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۳۸۹: ۱۷: ۲۷۴-۲۸۰

دریافت: ۱۳۸۸/۰۵/۲۷ اصلاح نهایی: ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

<sup>۱</sup> نویسنده مسؤول؛ استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

آدرس: مشهد- قاسم آباد- امامیه ۴۲- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

تلفن: ۰۵۱۱-۶۲۲۳۱۳۷- نمبر: ۰۵۱۱-۶۲۲۸۳۱۰. پست الکترونیکی: baharara@yahoo.com

<sup>۲</sup> استادیار مرکز تحقیقاتی ناباروری منتصریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد سلوی تکوینی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

**مقدمه**

(۱۰). سایر مطالعات بر روی اwooسيت‌هاي موش خرما و خوك نشان داده است که کاربرد گنادوتروپين جفتی، سبب افزایش میزان بلوغ اwooسيت‌ها می‌شود (۱۱، ۱۲). نتایج سایر مطالعات نیز بیانگر اثرات مفید گنادوتروپین جفتی انسان در القای فولیکول‌زایی و تخمک‌گذاری در بیماران دارای سندروم تخمدان پلی‌کیستیک است (۱۳، ۱۴).

با توجه به اهمیت گنادوتروپین جفتی انسان در تحریک تخمدان در مطالعات باروری و ژنتیک و افزایش تعداد تخمک‌های مورد نیاز، و با توجه به کمبود مطالعات علمی در شرایط درون‌تنی<sup>۵</sup> در مورد گنادوتروپین‌ها به علت موانع قانونی و اخلاقی، در پژوهش حاضر اثر گنادوتروپین جفتی انسان با غلظت ۵ IU/ml بر فولیکول‌های تخمدانی موش‌های نابالغ Balb/c بررسی شد.

**روش تحقیق**

این تحقیق از نوع تجربی آزمایشگاهی به مدت ۱۲ ماه در آزمایشگاه تحقیقاتی سلوی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری منتصريه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. برای بررسی اثرات گنادوتروپین جفتی انسان بر فولیکول‌های تخمدانی، از موش‌های ماده باکره ۲۱ روزه نژاد Balb/c با وزن تقریبی ۱۵-۱۲ گرم استفاده شد. موش‌های مورد مطالعه از مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی مشهد تهیه شد؛ از موش‌ها در اتاق نگهداری حیوانات با دمای  $22\pm2$  درجه سانتیگراد و دوره ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شد. در تمام مدت نگهداری، حیوانات به آب و غذا دسترسی داشتند؛ غذای آنها از شرکت جوانه خراسان به صورت آماده تهیه و از آب تصفیه شده استفاده می‌کردند. برای انجام مطالعه، تعداد ۳۰ سر موش ماده باکره به صورت تصادفی در سه گروه مساوی مطابق ذیل تقسیم شدند:

- گروه شاهد: از موش‌های این گروه در اتاق پرورش

در مطالعات تولید مثل و ناباروری و تولید نمونه‌های جدید ژنتیکی، تحریک تخمدانی و افزایش تعداد تخمک‌های قابل دسترس توسط گنادوتروپین‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. موش نمونه آزمایشگاهی مناسبی برای این گونه پژوهش‌ها می‌باشد. فولیکول‌های تخمدانی، رشد و نمو خود را به عنوان ساختارهای اولیه‌ای که حاوی یک اwooسيت متوقف شده در مرحله دیپلوتون اولین تقسیم می‌باشند، در پاسخ به یک سری از علائم آغاز می‌نمایند (۱). هنگامی که فولیکول‌ها رشد خود را آغاز می‌کنند، سلول‌های گرانولوزه مکعبی شده و شاخص‌های تکثیر سلوی را نشان می‌دهند (۲). طبق گزارشات علمی منتشرشده برخی عوامل از جمله هورمون‌های FSH<sup>۱</sup>، GDF<sup>۲</sup> و  $\beta$ FGF<sup>۳</sup>، رشد فولیکول‌های اولیه را تحریک می‌کنند و برخی دیگر از هورمون‌ها انتقال فولیکول اولیه به ثانویه را تحریک می‌کنند؛ اغلب این گزارشات در مورد جوندگان ارائه شده است (۳). عامل رشد اپیدرمی، رشد فولیکول‌های پری‌انترال و تبدیل آن به فولیکول آنترال اولیه را افزایش می‌دهد (۴). گنادوتروپین جفتی انسان (hCG)<sup>۴</sup> یک عضو از خانواده هورمون‌ها است که تزریق آن برای القای اولولاسیون در درمان ناباروری کاربرد دارد (۵). اثرات گنادوتروپین‌ها بر بلوغ آزمایشگاهی اwooسيت‌های نابالغ انسانی در مطالعات زیادی بررسی شده است (۷۶). مطالعه Chian و همکاران نشان داده است که در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک، تزریق گنادوتروپین جفتی باعث افزایش بلوغ اwooسيت‌ها در طی ۴۸ ساعت اول کشت می‌شود (۸). مطالعه بر روی اwooسيت‌های سگ نشان داد که وجود گنادوتروپین جفتی انسان در محیط کشت، سبب افزایش تعداد تخمک‌های بالغ می‌شود (۹)؛ همچنین افزودن گنادوتروپین جفتی انسان به محیط کشت سبب افزایش قابل ملاحظه اwooسيت‌های بالغ انسان می‌شود

<sup>۱</sup>Follicle Stimulating Hormone  
<sup>۲</sup>Growth differentiation factor  
<sup>۳</sup>Fibroblastic Growth Factor  
<sup>۴</sup>Human Chorionic Gonadotropin

## یافته‌ها

مقایسه میانگین وزن و اندازه تخدمان و نیز میانگین تعداد فولیکول‌های اولیه، ثانویه، در حال رشد و نیز فولیکول‌های آنترال اولیه تخدمانی موش‌های گروه شاهد با شاهد آزمایشگاهی تفاوت معنی‌داری نشان نداد ( $P > 0.05$ ). مقایسه اندازه تخدمان، تعداد فولیکول اولیه و ثانویه بین گروه تجربی و گروه شاهد نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد ( $P > 0.05$ ). متوسط وزن تخدمان‌ها، میانگین تعداد فولیکول‌های در حال رشد و فولیکول‌های آنترال اولیه در نمونه‌های گروه تجربی نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی افزایش معنی‌داری نشان داد ( $P = 0.001$  برای هر کدام) (جدول ۱).

## بحث

در طی رشد و نمو فولیکول‌ها در پستانداران، عوامل رشد و گنادوتروپین‌ها به همراه گیرنده‌های آنها ایجاد می‌شوند (۱۶). مشخص شده است که در سلول‌های کومولوس فولیکولی، متابولیسم گلوکز تحت تأثیر گنادوتروپین‌ها افزایش یافته، در نهایت منجر به رشد فولیکول‌های پری‌آنترال و آنترال می‌گردد (۱۷)؛ همچنین گنادوتروپین جفتی انسان، سبب افزایش نفوذپذیری رگ‌های تخدمان و انتقال مواد ضروری برای گسترش کومولوس و رشد فولیکول می‌گردد که این موضوع سبب رشد فولیکول‌ها و افزایش فولیکول‌های در حال رشد می‌شود (۱۸)؛ همچنین گنادوتروپین جفتی انسان سبب افزایش اکسیداسیون گلوکز در طی بلوغ آزمایشگاهی تخمک گاو شده، ظرفیت‌های رشد و نموی آن را افزایش می‌دهد (۱۹). مطالعات قبلی نشان داده است که هورمون HMG<sup>۵</sup> محركه فولیکولی نوترکیب (rFSH)<sup>۴</sup> و هورمون HMG<sup>۶</sup> تأثیری بر مراحل اولیه رشد و نمو فولیکول‌های تخدمانی موش ندارد؛ در حالی که HMG بر مراحل انتهایی تکوین فولیکول‌ها مؤثر بوده، میزان تخمک‌گذاری را افزایش می‌دهد

<sup>۴</sup> recombinant Follicle Stimulating Hormone  
<sup>۵</sup> Human Menopausal Hormone

حیوانات و در شرایط طبیعی نگهداری شد.

- گروه شاهد آزمایشگاهی (Sham-Exposed): به موش‌های این گروه ۱۰ میلی‌لیتر محلول نرمال سالین ۹٪ تزریق شد.

- گروه تجربی: به موش‌های این گروه ۱۰ میلی‌لیتر هورمون hCG (۵ IU/ml)<sup>۷</sup> تزریق گردید (۱۵، ۱۱).

موش‌های تیمارشده و همچنین موش‌های گروه شاهد و شاهد آزمایشگاهی، ۱۸ ساعت پس از تزریق توسط کلروفرم کشته شدند. پس از تشریح، تخدمان‌های موش‌ها خارج و به ظرف محتوی سرم فیزیولوژی منتقل گردید. پس از حذف چربی‌های اضافی اطراف تخدمان، بعد آنها توسط استرئومیکروسکوپ مدرج<sup>۸</sup> و وزن آنها توسط ترازوی دیجیتالی<sup>۹</sup> اندازه‌گیری و ثبت شد؛ سپس برای انجام مطالعات بافت‌شناسی با استفاده از میکروسکوپ نوری، تخدمان‌ها ثبیت و پس از آب‌گیری و قالب‌گیری، برش‌های متوالی ۶ میکرونی تهیه و به روش هماتوکسیلین اوزین هاریس رنگ‌آمیزی و لامهای دائمی تهیه گردید. تعداد فولیکول‌های اولیه، ثانویه، در حال رشد و نیز فولیکول‌های آنترال اولیه در مقاطع سه‌می میانی بررسی و شمارش گردید. برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در شمارش، ابتدا یک فولیکول انتخاب و سایر فولیکول‌ها در جهت عقربه‌های ساعت شمارش شدند. تمام مراحل فوق برای نمونه‌های شاهد و شاهد آزمایشگاهی نیز انجام شد. داده‌های کمی حاصل با استفاده از آزمون ANOVA و همچنین به منظور بررسی میانگین تعداد انواع فولیکول‌ها با پس‌آزمون Kolmogorov-Smirnov در SPSS سطح معنی‌داری داری ( $P < 0.05$ ) به کمک نرم‌افزار آماری تجزیه و تحلیل گردید.

مجریان در تمام مراحل انجام پژوهش، نظیر نگهداری حیوان، بیهوش نمودن و تشریح حیوان متعهد به رعایت اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی بودند.

<sup>۱</sup> ساخت شرکت Holland Organon.

<sup>۲</sup> ساخت شرکت صا ایران، ایران.

<sup>۳</sup> ساخت شرکت Germany Sartorius.

فولیکول‌های در حال رشد می‌گردد (۲۳)؛ همچنین یافته‌های حاصل از تحقیق Klatchkov و همکاران بر روی خزهای ماده، بیانگر این مطلب است که استفاده از گنادوتروپین جفتی انسان سبب افزایش تعداد فولیکول‌های بالغ پیش از دوره استتروس و در دوره استتروس می‌شود و باوری در این جانور وابسته به پاسخ فولیکولی به تحريك توسط گنادوتروپین جفتی انسان می‌باشد (۲۴).

### نتیجه گیری

بر اساس یافته‌های این مطالعه، می‌توان اذعان داشت که گنادوتروپین جفتی انسان عاملی مؤثر در مراحل انتهاهی تکوین فولیکول‌های تخدمانی موش است و سبب افزایش میزان فولیکول‌های در حال رشد و آنترال اولیه و همچنین افزایش وزن تخدمان در موش ماده نژاد Balb/c می‌شود.

### تقدیر و تشکر

از همکاران محترم آزمایشگاه تحقیقاتی تکوین جانوری گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نیز همکاران محترم مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری متصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکر و قدردانی می‌شود.

جدول ۱- مقایسه آماری میانگین وزن و اندازه تخدمان و تعداد فولیکول‌های اولیه، ثانویه، در حال رشد و آنترال اولیه در گروه‌های شاهد، شاهد آزمایشگاهی و تجربی

متغیرها (میلیمتر)	اندازه تخدمان	وزن تخدمان (گرم)	تعداد فولیکول				متغیرها گروه‌ها
			آنترال اولیه	در حال رشد	ثانویه	اولیه	
شاهد	۳/۴۰۵±۱/۴۲	.۰۰۶۴±.۰۰۱	۱/۸۵±۰/۲۸	۱/۷±۰/۲۳	۶/۸±۰/۶۳	۱/۴±۰/۱۱	
شاهد آزمایشگاهی	۳/۶۶۵±۰/۱۳۵	.۰۰۴۷±۰/۰۰۰۳۶	۲/۴۵±۰/۱۷۰	۲/۳±۰/۲۰۶	۵/۸۶±۰/۱۷۲	۲±۰/۱۷۸	
HCG تیمار	۳/۸۶±۰/۱۴۸۷	.۰۰۷۲±۰/۰۰۰۴۴	۳/۵۵±۰/۲۲۳	۳/۳۵±۰/۱۳۳	۷/۳۵±۰/۲۸۴	۵/۶۵±۰/۲۰۹	
سطح معنی‌داری	۰/۳۳۸	.۰/۰۱	.۰/۰۸۲	.۰/۰۸۲	.۰/۰۰۱	.۰/۰۰۱	

### منابع:

- Thomas FH, Walters KA, Teffler EE. How to make a good oocyte: an update on in-vitro models to study follicle regulation. Hum Reprod Update. 2003; 9(6): 541-55.
- Wandji SA, Sriven V, Nathanielsz PW, Eppig JJ, Fortune JE. Initiation of growth of baboon primordial follicles in vitro. Hum Reprod. 1997; 12(9): 1993-2001.

- 3- Fortune JE. The early stage of follicular development: activation of primordial follicles and growth preantral follicles. *Anim Reprod Sci.* 2003; 78(3-4): 135-63.
- 4- Hirshfield AN. Development of follicles in the mammalian ovary. *Int Rev Cytol.* 1991; 124: 43-101.
- 5- Stenman UH, Tiitinen A, Alftan H, Valmu L. The classification, functions and clinical use of different isoforms of HCG. *Hum Reprod Update.* 2006; 12(6): 769-84.
- 6- Baharara J, Moosavifar N, Jalali M, Adl F. The effect of HCG on in vitro maturation of human immature oocytes and rate of 8 cell embryos mediated by ICSI. *Armaghan Danesh.* 2008; 12(4): 55-63. [Persian]
- 7- Baharara J, Moosavifar N, Jalali M, Maghani M. Effect of human menopause gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormones on in vitro maturation of human immature oocytes and rate of eight cell embryos mediated by intracytoplasmic sperm injection. *Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.* 2008; 11(3): 43-50. [Persian]
- 8- Chian RC, Bucket WM, Tulandi T, Tan SL. Prospective randomized study of human chorionic gonadotrophin priming before immature oocyte retrieval from unstimulated women with polycystic ovarian syndrome. *Hum Reprod.* 2000; 15(1): 165-70.
- 9- De los Reyes M, de Lange J, Miranda P, Palominos J, Barros C. Effect of human chorionic gonadotrophin supplementation during different culture periods on in vitro maturation of canine oocytes. *Theriogenology.* 2005; 64(1): 1-11.
- 10- Yang SH, Son WY, Yoon SH, Ko Y, Lim JH. Correlation between in vitro maturation and expression of LH receptor in cumulus cells of the oocytes collected from PCOS patients in HCG-primed IVM cycles. *Hum Reprod.* 2005; 20(8): 2097-103.
- 11- Li Z, Jiang Q, Rezaei Sabet M, Zhang Y, Ritchie TC, Engelhardt JF. Conditions for in vitro maturation and artificial activation of ferret oocytes. *Biol Reprod.* 2002; 66(5): 1380-86.
- 12- Lechniak D, Szczepankiewicz D, Kauss D, Szulc J, Szydłowski M. IVM media, oocyte diameter and donor genotype at RYR1 locus in relation to the incidence of porcine diploid oocytes after maturation in vitro. *Theriogenology.* 2005; 64(1): 202-12.
- 13- Gomes MK, Vieira CS, Moura MD, Manetta LA, Leite SP, Reis RM, et al. Controlled ovarian stimulation with exclusive FSH followed by stimulation with hCG alone, FSH alone or hMG. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2007; 130(1): 99-106.
- 14- Branigan EF, Estes A. Use of micro-dose human chorionic gonadotropin (hCG) after clomiphene citrate (CC) to complete folliculogenesis in previous CC-resistant an ovulation. *Am J Obstet Gynecol.* 2005; 192(6): 1890-94.
- 15- Eppig JJ. Regulation of cumulus oophorus expansion by gonadotropins in vivo and in vitro. *Biol Reprod.* 1980; 23(3): 545-52.
- 16- McNatty KP, Heath DA, Lundy T, Fidler AE, Quirke L, O'Connell A, et al. Control of early ovarian follicular development. *J Reprod Fertil Suppl.* 1999; 54: 3-16.
- 17- Sutton ML, Cetica PD, Beconi MT, Kind KL, Gilchrist RB, Thompson JG. Influence of oocyte-secreted factors and culture duration on the metabolic activity of bovine cumulus cell complexes. *Reproduction.* 2003; 126(1): 27-34.
- 18- Nagyova E, Camaiori A, Prochazka R, Salustri A. Covalent transfer of heavy chains of inter-alpha-trypsin inhibitor family proteins to hyaluronan in vivo and in vitro expanded porcine oocyte-cumulus complexes. *Biol Reprod.* 2004; 71(6): 1838-43.
- 19- Brackett BJ, Zuelke KA. Analysis of factors involved in the in vitro production of bovine embryos. *Theriogenology.* 1993; 39(1): 43-64.
- 20- Baharara J, Moosavifar N, Jalali M, Moghani Lankarani M. Effects of HMG & R-FSH on development of ovarian follicles of female Balb/c mouse. *Feyz.* 2008; 12(1): 1-8. [Persian]
- 21- Rose UM, Hanssen RG, Kloosterboer HJ. Development and characterization of an in vitro ovulation model using mouse ovarian follicles. *Biol Reprod.* 1999; 61(2): 503-11.

- 22- Svensson EC, Markström E, Andersson M, Billig H. Progesterone receptor-mediated inhibition of apoptosis in granulosa cells isolated from rats treated with human chorionic gonadotropin. *Biol Reprod.* 2000; 63(5): 1457-64.
- 23- Borman SM, Chaffin CL, Schwinof KM, Stouffer RL, Zelinski-Wooten MB. Progesterone promotes oocyte maturation, but not ovulation, in nonhuman primate follicles without a gonadotropin surge. *Biol Reprod.* 2004; 71(1): 366-73.
- 24- Klotchkov DV, Eryuchenkov PA. Effects of hCG on folliculogenesis and fecundity in mink (*Mustela vision Schreb*). *Theriogenology.* 2003; 60(9): 1583-93.

## The effects of Human ChorionicGonadotropin (hCG) on development of ovarian follicles of Balb/c race mouse

**J. Baharara<sup>1</sup>, N. Mosavifar<sup>2</sup>, M. Jalali<sup>2</sup>, F. Adl<sup>3</sup>**

**Background and Aim:** Controlled ovarian stimulation (COS) using gonadotropin is an important technique in the infertility and genetics research. The effect of hCG on development of ovarian follicles of Balb/c race mouse was studied in this investigation.

**Materials and Methods:** In this experimental study, 30 virgin female Balb/c mice (21 days) were selected and divided into three groups of control, sham exposed (0.1ccNormal saline) and experimental group (0.1cc hCG 5IU/ml). The Mice were scarified 18 hours later by chloroform injection, and their ovaries were removed for morphometric and histological studies and the weight and size were recorded. The number of primary, secondary, growing and early antral follicles were determined and compared for each sample by light microscopy. The data were analyzed by means of SPSS software using ANOVA and Kolmogorov-Smirnov tests at the significant level of  $P<0.05$ .

**Results:** There was no significant difference in the size of ovary, the average number of primary and secondary follicle among the 3 groups of mice ( $P>0.05$ ). The administration of hCG caused a significant increase in ovarian weight and the average number of growing and early antral follicles compared with control and sham exposed groups ( $P=0.001$ ).

**Conclusion:** The results of this study indicate that the effect of hCG hormone on ovarian follicles growth rate, is higher in end-stages of development.

**Key Words:** Human chorionic gonadotropin (hCG), ovary, Balb/c mouse, follicular development

*Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2011; 17(4):274-280*

*Received: 18.08.2009   Last Revised: 05.10.2010   Accepted: 26.10.2010*

<sup>1</sup>Corresponding Author; Assistant Professor, Department of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran  
baharara@yahoo.com

<sup>2</sup>Assistant Professor, Montaserieh IVF Research Center, Mashhad University of Medical Science Mashhad , Iran

<sup>3</sup>MSc of Cell & Developmental Biology, Department of Biology, Islamic Azad University Mashhad Branch, Mashhad ,Iran